

Lavatera thuringiaca (Slézovec durynský)

synonyma: *Althaea thuringiaca*, *Malva thuringiaca*, *Olbia thuringiaca*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, Manitoba, Minnesota, Německo, Nový Brunšvik, Ontario, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Ťan-šan, V Evropa, Wyoming

Roste ve východní, střední a jižní Evropě a jihozápadní Asii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 1,8)m. Listy jsou 3 - 5ti laločnaté, hustě hvězdovitě nebo svazčitě ochlupené a široké až 9cm. Kvete růžovými květy o průměru 3 - 7cm s více než 5ti hluboce vykrojenými korunními lístky délky 2,5 - 4,5cm. Plody jsou hladké a složené z 18 - 24 plůdků. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *thuringica* (Slézovec durynský pravý)
- subsp. *ambigua* - jižní Francie, Itálie, západní Balkán

Roste na stepích, v křovinách, pastvinách, náspech, atp. Vyhovuje mu plné slunce a zem bohatá na živiny (nejlépe vápnitá). Pro prodloužení doby kvetení se po odkvětu větve zastřihávají. Nesmí být však stříh příliš hluboký.

Množí se řízkováním polodřevnatých větví.

<https://www.rostliny.net/>