

Ptilostemon gnaphaloides

synonyma: *Carduus gnaphalodes*, *Chamaepeuce gnaphalodes*, *Cirsium chamaepeuce* var. *gnaphalioides*, *Cirsium gnaphalodes*, *Cnicus chamaepeuce*, *Cnicus gnaphalodes*, *Cnicus gnaphaloides*, *Staelina chamaepeuce*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Francie, J Itálie, Kréta, Řecko

Roste v Itálii, Řecku a Krétě. Habitus je kulovitý. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Povrch není trnitý, místo toho je bohatě olistěný. Větve jsou plstnaté. Listy jsou střídavé, čárkovité, podvinuté, špičaté, dlouhé 3 - 10cm, široké 1 - 1,5mm, na spodní straně ochlupené, přisedlé, občas s 1 - 2mi úzkými úkrojky z každé strany a na rozdíl od *P. chamaepeuce* jsou horní výrazně kratší. Stonky s květy jsou dlouhé 10 - 60cm, květenství je 1 - 10tičetné, tvoří jej úbory o průměru 1,3 - 2cm, zákrov má délku 1,4 - 2,2cm, průměr 1,3 - 2,3cm, zákrovní listy mohou být ochlupené, střechovitě srovnané, přitisklé, osinaté a pichlavé, vlastní květy jsou oboupohlavné a růžové. Plodem je 4 - 6mm dlouhá nažka s chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *gnaphaloides*/*Cirsium gnaphaloides* - Itálie, Řecko, Francie; listy mají u báze výstřížky o délce 0,3 - 2 (i 4)mm; zákrov je dlouhý 1,6 - 2,2cm, v průměru má 1,5 - 1,8 (i 2,5)cm
- subsp. *pseudofruticosus* - Řecko, Kréta; listy mají u báze výstřížky o délce 1 - 5 (i 9)mm; zákrov je dlouhý 1,8 - 2,5cm, v průměru má 1,8 - 2,6cm

<https://www.rostliny.net/>