

Halimium halimifolium (Devaterníkovec obecný)

synonyma: *Cistus halimifolius*, *Cistus lepidotus*, *H. subsp. lepidotum*, *Halimium lepidotum*, *Helianthemum halimifolium*, *Strobon halimifolium*

čeleď: Cistaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Francie, J Itálie, Katalánsko, Korsika, Maroko, Portugalsko, Sardínie, Střední Itálie, Tunisko

Roste v západním středozeří v křovinách v podobě polokeře až keře. Dorůstá výšky 0,7 - 1,5 (i 2)m. Větve jsou ochlupené a šupinaté. Listy jsou vstřícné, celokrajné, jemně řídce ochlupené, šedozelené, mělce laločnaté, mírně oválné, dlouhé 1,5 - 4,5cm, široké 4 - 9mm (na kvetoucích stoncích menší), žilnatinu tvoří 3 žilky a řapíky jsou krátké. Květenství je terminální, latnaté, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní lístky jsou v počtu 5ti ks, jsou šupinovitě ochlupené, dlouhé 4 - 8mm (2 vnější jsou menší) a korunní lístky jsou žluté, u báze mají tmavou skvrnu a dlouhé 0,8 - 1cm. Plodem je vejčitá ochlupená tobolka délky 4 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *halimifolium* - výška 0,3 - 1m; kališní lístky nemají chlupy, korunní lístky klínovité
- subsp. *multiflorum*/*H. multiflorum* - Španělsko, Portugalsko a Maroko; výška 30 - 40cm; kališní lístky ochlupené, korunní lístky obsrdčité

Vyhovují jí písčité půdy a plné slunce.

<https://www.rostliny.net/>