

## Bocconia frutescens

synonyma: *B. f. glaucescens*, *B. f. subtomentosa*, *B. var. cernua*, *B. var. glaucescens*, *B. var. subtomentosa*, *Bocconia glauca*, *Bocconia quercifolia*, *Bocconia sinuatifolia*, *Bocconia subtomentosa*

čeleď: Papaveraceae

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Peru, Portoriko, Venezuela

Roste od Mexika po Kolumbii a Peru v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6 (i 7,5)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Při poranění roní oranžovou tekutinu. Listy jsou střídavé, řapíkaté, vejčité, peřenoklané či hluboce laločnaté, báze je tupá, délka dosahuje (5 -) 10 - 30 (i 50)cm, šířka (3,5 -) 7 - 23 (i 28)cm, laloky jsou tupé, šedozelené a vykrajované. Květenstvím je pyramidální, latnaté, dlouhé 20 - 60cm, listeny jsou špičaté, dlouhé 2 - 5mm, vlastní květy mají 2 kališní bělavé lístky délky 0,8 - 1cm a 8 - 16 tyčinek. Plodem jsou eliptické tobolky, dlouhé 0,6 - 1,2cm a mají 1 černé semeno délky 6 - 7mm a šířky 3 - 3,5mm.

Vyhovují jí vlhké křoviny nebo lesy, příležitostně i louky či okraje cest.

<https://www.rostliny.net/>