

Vaccinium acuminatissimum

synonyma: *Adnaria lanceolata*, *Agapetes acuminatissima*, *Agapetes lanceolata*, *Gaylussacia lanceolata*, *Rigiolepis lanceolata*, *Vaccinium lanceolatum*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Jáva, Malajský poloostrov, Sumatra

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. *acuminatissimum*/f. *javanicum*/f. *sumatranum*/var. *singalense*/*Thibaudia singalensis*/*Rigiolepis lanceolata* f. *sumatrana*/*V. lanceolatum* f. *sumatranum* - Sumatra, Malajský poloostrov, Jáva; epifyt nebo šplhavý keř; délka až 30m při průměru kmene do 8cm; listy vejčité, ocasovité, kožovité, v mládí ochlupené, okraj mírně podvinutý, dlouhé 9 - 14cm, široké 1,8 - 4,7cm, spodní strana žláznatá, řapíky ochlupené, dlouhé 2 - 5mm; květenstvím je 8 - 15tičetný hrozen, vlastní květy baňkovité, bílé až béžové, dlouhé 2,5 - 3mm, průměr do 2,5mm; plody kulovité, červené, průměru 4mm

- f. *ellipticum*/*Rigiolepis lanceolata* f. *elliptica*/*V. lanceolatum* f. *ellipticum* - listy eliptické, občas zkosené, přišpičatělé, dlouhé 7 - 13cm, široké 2,5 - 4,7cm

- f. *marapiense*/*Rigiolepis lanceolata* f. *marapiensis*/*Rigiolepis lanceolata* f. *lanceolatum* - Sumatra; listy kožovité, dlouhé 4,2 - 8,5cm, široké 1,1 - 2cm

<https://www.rostliny.net/>