

# Alyxia

synonyma: Alexia, Discalyxia, Gynopogon, Palussarium, Paralstonia, Pulassarium

čeleď: Gentianaceae

Roste od Číny přes jihovýchodní Asii po Austrálii, Novou Kaledonii a tichomořské ostrovy včetně Havajských ostrovů. Jedná se o dřevité rostliny, které dokáží i šplhat. Listy jsou 3 - 4četné přeslenité (i vstřícné). Kvete ve vrcholících, vlastní květy jsou 5tičetné s rozeklaným kalichem a trubkou v barvě bílé (i žluté). Plody bývají párovité.

## Alyxia acuminata

synonyma: *A. acuminata* var. *lancifolia*, *A. acuminata* var. *montana*, *A. clemensiae*, *A. maluensis*, *Gynopogon acuminatus*

## Alyxia angustifolia

synonyma: *A. pachyphylla*, *A. pagonensis*

## Alyxia angustissima

## Alyxia annamensis

synonyma: *A. divaricata*, *A. poilanei*

## Alyxia arfakensis

## Alyxia baillonii

synonyma: *A. laurina*, *Gynopogon laurinus*

## Alyxia balansae

synonyma: *A. kontumensis*, *A. villilimba*, *A. villilimba* var. *macrophylla*, *A. yunkuniana*, *A. yunkuniana* var. *pubescens*

## Alyxia bracteolosa

synonyma: *A. bracteolosa* var. *angustifolia*, *A. bracteolosa* var. *brcteolosa*, *A. bracteolosa* var. *macrocarpa*, *A. bracteolosa* var. *parvifolia*, *A. bracteolosa* var. *retusa*, *A. erythrosperma* var. *samoensis*, *A. ovalifolia*, *A. samoensis*, *A. septangularis*

## Alyxia buxifolia

synonyma: *A. buxifolia* var. *subacuta*, *A. capitellata*, *Gynopogon buxifolius*, *Pulassarium buxifolium*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného širokého keře. Dorůstá výšky do 0,5 (i 3)m. Listy jsou

vstřícné (i 3četně přeslenité), tuhé, eliptické, mírně špičaté, zelené, lesklé, celokrajné, dlouhé 1 - 4 (i 5,2)cm a široké 0,5 - 2,1 (i 2,5)cm. Kvete bílými 5tičetnými oranžovými květy s 1 - 2mm stopkami, 8 - 9mm trubkou, bílými laloky v terminální 2 - 7mičetných svazcích. Plodem je červenooranžová kulovitá peckovice délky 6 - 8mm.

### Alyxia cacuminum

### Alyxia caletioides

synonyma: *Gynopogon caletioides*

### Alyxia celebica

### Alyxia clusiophylla

synonyma: *A. suavis*, *Gynopogon clusiophyllus*, *Gynopogon suavis*

### Alyxia composita

synonyma: *A. lata*

### Alyxia concatenata

synonyma: *A. clusiacea*, *A. confertiflora*, *A. monilifera*, *Brabejum concatenatum*, *Gynopogon monilifera*, *Gynopogon moniliferus*, *Paralstonia clusiacea*

### Alyxia cylindrocarpa

synonyma: *A. cylindrocarpa* var. *obtusiuscula*

### Alyxia defoliata

synonyma: *A. defoliata* subsp. *orientalis*

### Alyxia efatensis

### Alyxia erythrosperma

### Alyxia evansii

oblasti: Severní teritorium

Roste v Austrálii.

### Alyxia fascicularis

synonyma: *Gynopogon fascicularis*, *Hunteria fascicularis*, *Pulassarium fasciculare*

oblasti: Indie, Thajsko, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii a Thajsku v podobě dřevité liány. Dorůstá délky do 2m. Borka je bleděšedá s bradavičkami. Listy jsou vstřícné nebo 3četně přeslenité, eliptické, ocasovité, dlouhé 6 - 10cm, široké 1,7 - 3cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Kvete v hustém vrcholíku s krátkou stopkou, vlastní květy mají trubku délky 3mm.

### Alyxia floribunda

#### Alyxia ganophylla

synonyma: A. induta, A. markgrafiana

#### Alyxia glaucophylla

synonyma: A. canaleensis, Pulassarium glaucophyllum

### Alyxia globosa

#### Alyxia graciliflora

#### Alyxia gracilis

synonyma: Gynopogon gracilis, Hunteria gracilis, Pulassarium gracile

oblasti: V Indie

Roste v Indii v podobě ovíjivého keře. Větve jsou světlé. Listy jsou úzce eliptické, ocasovité, dlouhé 4,5 - 12m, široké 1,6 - 4,2cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenstvím je lata, vlastní květy mají trubku délky 1,5 - 3mm s 3mm laloky. Plody jsou eliptické délky téměř 2cm.

### Alyxia grandis

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě liány. Listy jsou vstřícné nebo 3četně přeslenité, eliptické, špičaté, dlouhé do 11cm a široké až 4cm. Květenství tvoří béžovožluté květy s trubkou délky 2,5 - 3mm, kopinatými laloky délky kolem 2mm, celková délka květu je 3 - 4mm a průměr 2,5 - 4mm.

#### Alyxia gynopogon

synonyma: A. daphnoides, A. forsteri, A. pubescens, Gynopogon alyxia, Pulassarium alyxia, Pulassarium daphnodes

oblasti: Tichý oceán

Roste na ostrově Norfolk. Kvete bílými 5tičetnými květy.

## Alyxia hainanensis

oblasti: Hainan

## Alyxia halmheirae

synonyma: A. gynopogona, Pulassarium halmheirae

## Alyxia hurlimannii

synonyma: A. baumannii

## Alyxia ilicifolia

synonyma: Gynopogon ilicifolius, Pulassarium ilicifolium

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 5m. Listy jsou vstřícné nebo 3 - 4četně přeslenité, mírně obvejčité, celokrajné nebo zubaté, špičaté, kožovité, dlouhé do 15cm a široké 5cm. Květenství má délku 2cm, tvoří je květy délky i šířky 0,8 - 1,1cm, mají 1 - 3mm stopky, kališní lístky délky do 5,5mm, koruna je světleběžová, trubka má délku 0,7 - 1cm a laloky mají délku 3 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. ilicifolia - listy zvlněně vykrajované, mohou být i trnité; kališní lístky dlouhé do 2,3mm
- subsp. magnifolia/A. magnifolia - listy zvlněně vykrajované, prakticky celokrajné; kališní lístky dlouhé až 5,5mm

## Alyxia insularis

oblasti: JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou 4hranné. Listy bývají 4četně přeslenité, vejčité, kožovité, tupě zkulacené, dlouhé 5,5 - 10cm, široké 2,5 - 3,5cm a řapík je dlouhý 1 - 1,5cm. Květenství je terminální, složené ze svazečků, vlastní květy mají trubku délky do 1cm, laloky délky 5mm a kališní lístky jsou dlouhé kolem 3,5mm. Plody jsou eliptické, dlouhé 1 - 2cm, průměru kolem 1cm a obsahují 1 - 2 semena.

## Alyxia kaalaensis

## Alyxia kabaenae

## Alyxia kendarica

## Alyxia kwalotabaa

## Alyxia lackii

### Alyxia lamii

synonyma: A. subalpina

### Alyxia laurina

synonyma: Pulassarium laurinum

### Alyxia leucogyne

synonyma: A. sapiifolia, Gynopogon sapiifolius, Pulassarium leucogyne

### Alyxia levinei

synonyma: A. acutifolia, A. kweichowensis

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou vstřícné nebo 3četně přeslenité, eliptické, špičaté, dlouhé 3,5 - 8cm, široké 1,2 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 4 - 7mm. Kvete v paždí listů ve vrcholících na 0,5 - 2cm stopce, má 2 i více eliptických listenů, vlastní květy jsou zelenobílé, trubka má délku 3mm, laloky jsou dlouhé pouze 1,5mm a kališní lístky jsou dlouhé 1,5 - 3mm.

### Alyxia linearis

synonyma: A. rosmarinifolia

### Alyxia loeseneriana

synonyma: A. johnsoniae, A. loeseneriana var. macrocarpa, A. vieillardii

### Alyxia longiloba

### Alyxia luzoniensis

synonyma: A. blancoi, A. ecostata, A. lanceolata, A. laxiflora, A. stenophylla, Brabejum lucidum

oblasti: Luzon

### Alyxia magnifolia

synonyma: A. ilicifolia subsp. magnifolia

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

### Alyxia manusiana

## Alyxia margaretae

synonyma: A. integrarpa, A. margaretae var. acutifolia

## Alyxia marginata

synonyma: A. funingensis

oblasti: Guangxi, Kambodža, Laos, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Kambodži, Laosu a Vietnamu v podobě dřevité liány. Dorůstá délky do 3m. Větve jsou tmavěšedé, bradavičnaté. Listy jsou vstřícné nebo 3četně přeslenité, eliptické, dlouhé 7 - 17cm, široké 1,5 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Kvete v paždí listů ve vrcholících, vlastní květy jsou bílé, trubka má délku 0,5 - 1cm a kališní lístky jsou dlouhé 3 - 4cm.

## Alyxia markgrafii

synonyma: A. novoguineensis, A. schlechteri

## Alyxia menglungensis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě dřevité liány. Dorůstá délky do 4m. Větve jsou šedozelené. Listy jsou vstřícné nebo 3četně přeslenité, eliptické, dlouhé 9 - 12cm, široké 3 - 4cm a řapíky jsou dlouhé 1cm. Kvete v paždí listů anebo na koncích větví na 1 - 4cm stopce, vlastní květy jsou bílé, trubka dlouhá 6mm, laloky dlouhé 2mm a kališní lístky jsou dlouhé 2mm.

## Alyxia microphylla

## Alyxia minutiflora

## Alyxia monticola

synonyma: A. glabra, A. insularis, A. retusa, A. revoluta, A. sibuyanensis

## Alyxia mucronata

synonyma: A. cylindrocarpa subsp. coriaceum

## Alyxia muguma

## Alyxia mujongensis

## Alyxia multistriata

## Alyxia nathoi

### Alyxia oblongata

synonyma: A. ruscifolia subsp. major

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

## Alyxia obovatifolia

### Alyxia oleifolia

synonyma: A. kinabaluensis

### Alyxia oliviformis

synonyma: A. oliviformis var. lanceolata, A. oliviformis var. myrtillifolia, A. oliviformis var. ovata

## Alyxia oppositifolia

### Alyxia orophila

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky až 5m. Listy jsou 3 - 4četně přeslenité, eliptické, povinuté, špičaté, kožovité, dlouhé do 5cm a široké 2,5cm. Květy jsou bílé, mají délku 0,6 - 1cm, průměr 0,5 - 1cm, stopky velmi krátké, trubka je dlouhá 5 - 8mm, laloky dlouhé do 5,5mm a kališní lístky dlouhé 2 - 3mm.

### Alyxia oubatchensis

synonyma: A. obovata, A. obovata var. oubatchensis, Gynopogon oubatchensis

## Alyxia palawanensis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

### Alyxia papuana

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

## Alyxia parvifolia

synonyma: *Gynopogon parvifolius*

## Alyxia pilosa

synonyma: *A. atjehensis*, *A. scortechinii*, *A. selangorica*, *A. triptera*, *Pulassarium pilosum*

## Alyxia podocarpa

synonyma: *Pulassarium podocarpum*

## Alyxia poyaensis

synonyma: *A. rubricaulis* subsp. *poyaensis*

## Alyxia pseudosinensis

synonyma: *A. crassifolia*

## Alyxia pugio

## Alyxia pullei

## Alyxia punctata

## Alyxia purpureoclada

## Alyxia racemosa

## Alyxia reinwardtii

synonyma: *A. aromatica*, *A. calcicola*, *A. cinerea*, *A. flavescentia*, *A. forbesii*, *A. jasminae*, *A. kerrii*, *A. kurzii*, *A. lucida*, *A. lucida* var. *meiantha*, *A. nitens*, *A. odorata*, *A. oleifolia* var. *tenuifolia*, *A. pisiformis*, *A. pumila*, *A. quinata*, *A. reinwardtii* var. *cinerea*, *A. reinwardtii* var. *insularis*, *A. reinwardtii* var. *latifolia*, *A. reinwardtii* var. *lucida*, *A. reinwardtii* var. *meiantha*, *A. reinwardtii* var. *obovatula*, *A. reinwardtii* var. *pumila*, *A. stellata* var. *latifolia*, *A. winckelii*, *Gynopogon breviflorus*, *Gynopogon flavescentia*, *Gynopogon pisiformis*, *Gynopogon pumilus*, *Gynopogon reinwardtii*, *Pulassarium breviflorum*, *Pulassarium flavescentia*, *Pulassarium odoratum*, *Pulassarium pisiforme*, *Pulassarium pumilum*, *Pulassarium quinatum*

oblasti: Filipíny, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Indonésii, Malajsii, Filipínách, Thajsku a Vietnamu v podobě dřevité liány. Dorůstá délky do 3m. Větve jsou kulaté, v mládí 3hranné. Listy jsou vstřícné nebo 3 - 4četně přeslenité, eliptické, kožovité, špičaté, dlouhé 8 - 11cm, široké 1,5 - 2,5mm a řapíky jsou dlouhé do 5mm. Květenstvím je vrcholík s listenci, vlastní květy jsou nažloutlé, trubka má délku 8,5mm a laloky jsou

dlouhé 4mm. Plody jsou úzce eliptické, dlouhé 1,5cm s průměrem 5mm.

### Alyxia ridleyana

synonyma: A. fragrans, Discalyxia ridleyana

### Alyxia rostrata

synonyma: Discalyxia pullei, Discalyxia rostrata

### Alyxia royeniana

### Alyxia rubricaulis

synonyma: Gynopogon rubricaule, Gynopogon rubricaulis

### Alyxia ruscifolia

synonyma: A. pugioniformis, A. richardsonii, A. ruscifolia var. pugioniformis, A. ruscifolia var. ulicina, A. sharpei, Gynopogon pugioniformis, Gynopogon ruscifolius, Pulassarium ruscifolium

oblasti: JV Austrálie, Nová Guinea, Nový Jižní Wales, Queensland

Pochází z Austrálie a Nové Guineje. Dorůstá výšky 2 (i 5)m. Listy vyrůstají v 2 - 4četných přeslenech, jsou tmavězelené, úzce eliptické, špičaté, tuhé, lesklé a dlouhé 1 - 6 (i 6,5)cm a široké 2,7cm. Květenství je 3 - 5tičetné a vlastní květy jsou bílé nebo béžové, dlouhé 0,6 - 1,1cm, průměru 0,3 - 1,7cm mají krátkou stopku, trubku délky 0,5 - 1,1cm a kališní lístky délky do 5mm. Plody jsou červenooranžové a kulovité o průměru 0,8 - 1,1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. major/A. oblongata - Queensland; kališní lístky délky do 2mm, květy dlouhé 1cm průměru 0,9 - 1,7mm, trubka délky 1cm, laloky dlouhé 4,5 - 7,5mm
- subsp. ruscifolia/var. pugioniformis/var. ulicina/A. pugioniformus - Queensland, Nový Jižní Wales, Ostrov Lorda Howa; kališní lístky dlouhé 2mm, květy dlouhé 6 - 7mm průměru 3 - 6mm, trubka délky do 6,5mm, laloky dlouhé 2 - 4mm
- subsp. tropica - severní Austrálie, Nová Guinea; kališní lístky dlouhé 3mm, květy dlouhé 0,8 - 1cm průměru 0,8 - 1,1cm, trubka dlouhá 0,7 - 1cm, laloky dlouhé 5mm

### Alyxia sarasinii

### Alyxia scabrida

### Alyxia schlechteri

synonyma: A. bodinieri, A. schlechteri var. salicifolia, Daphne bodinieri, Wikstroemia bodinieri

oblasti: Guangxi, Guizhou, Thajsko, Yunnan

Roste v Číně a Thajsku v podobě dřevitě liány. Dorůstá délky do 3m. Větve jsou šedé, v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné nebo 3 - 4četně přeslenité, úzce eliptické, kožovité, špičaté, dlouhé 2 - 12cm, široké 0,5 - 1,5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je

svazečkovitý vrcholík, vlastní květy jsou žluté a kališní lístky dlouhé 2,5mm.

### Alyxia semipallescens

#### Alyxia sharpei

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 3m. Listy vyrůstají v 3 - 5tičetných přeslenech, jsou čárkovité, špičaté, kožovité, dlouhé do 4cm, široké do 1mm. Květenství je zakrnělé, listeny čárkovité, vlastní květy béžové, dlouhé 8mm, průměru 5mm, přisedlé, kališní lístky dlouhé 2mm, trubka dlouhá 6mm a laloky dlouhé 3mm.

### Alyxia siamensis

oblasti: Guangdong, Guangxi, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Thajsru a Vietnamu v podobě dřevité liány. Dorůstá délky do 8m. Borka je bradavičnatá. Listy jsou vstřícné nebo 3 - 4četně přeslenité, eliptické, povinuté, špičaté, dlouhé 7 - 19cm, široké 3 - 5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenstvím je vrcholík složený ze svazečků, vlastní květy jsou žluté, trubka má délku 2mm, laloky 1mm a kališní lístky dlouhé 1mm. Plody jsou samostatné nebo párovité, dlouhé 3 - 4,5cm s průměrem 1,2 - 1,5cm.

### Alyxia sinensis

synonyma: A. acutifolia, A. euonymifolia, A. kweichowensis, A. lehtungensis, A. levinei, A. taiwanensis, A. vulgaris, Pulassarium sinense

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Tchaj-wan, Zhejiang

Roste v Číně v podobě dřevité liány. Dorůstá délky do 3m. Listy jsou vstřícné nebo 3četně přeslenité, široce vejčité či obvejčité, kožovité, povinuté, tupé, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,8 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenstvím je hustý vrcholík složený ze svazečků, vlastní květy jsou červené až bílé a trubka má délku 2 - 3mm.

### Alyxia sleumeri

### Alyxia sogerensis

oblasti: Melanésie

Roste na Šalamounových ostrovech.

### Alyxia spicata

synonyma: *A. obtusifolia*, *A. spanogheana*, *A. tetragona*, *A. thyrsiflora*, *Fagraea tetragona*, *Gynopogon spicatus*, *Gynopogon tetragonos*, *Pulassarium obtusifolium*, *Pulassarium spanogheanum*, *Pulassarium spicatum*, *Pulassarium thyrsiflorum*

oblasti: Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste na Nové Guineji a Austrálii v podobě šplhavého polokeře až dřevité liány. Dorůstá výšky až 4m. Listy vyrůstají ve 4četných přeslenech na svislých větvích a v 3četných na vodorovných, jsou eliptické, špičaté nebo i tupé, dlouhé do 10cm a široké do 4cm. Květy mívají průměr 3 - 4mm a oranžové hrdlo, kališní lístky dlouhé do 2mm, trubku délky 2,5 - 3mm, laloky bělavé, dlouhé do 2mm. Plody jsou žluté až oranžové, ve zralosti až červené a v průměru mají 1cm.

### *Alyxia squamulosa*

synonyma: *A. lindii*, *Pulassarium lindii*, *Pulassarium squamulosum*

oblasti: JV Austrálie

Roste na Ostrovu Lorda Howa v podobě popínavé dřeviny. Listy vyrůstají v 5tičetných přeslenech, jsou tmavězelené, dlouhé 2 - 5 (i 9)cm, široké (1,5 - ) 2 - 2,5 (i 3)cm. Květenství je husté, terminální, v průměru má 2 - 4cm a vlastní květy jsou bílé a dlouhé 7mm. Plody jsou modročerné a mají délku 2cm.

### *Alyxia stellata*

synonyma: *A. amoena*, *A. brevipes*, *A. elliptica*, *A. fosbergii*, *A. intermedia*, *A. latilimba*, *A. linearifolia*, *A. myrtillifolia*, *A. obtusifolia*, *A. oliviformis*, *A. oliviformis f. ampla*, *A. oliviformis f. angusta*, *A. oliviformis f. cuneata*, *A. oliviformis f. elliptica*, *A. oliviformis f. fusiformis*, *A. oliviformis f. lanceolata*, *A. oliviformis f. linearis*, *A. oliviformis f. myrtillifolia*, *A. oliviformis f. obovata*, *A. oliviformis f. ovata*, *A. oliviformis f. retusa*, *A. oliviformis f. rotundata*, *A. oliviformis f. subacuta*, *A. oliviformis var. myrtillifolia*, *A. oliviformis var. ovata*, *A. palauensis*, *A. scandens*, *A. stellata f. marquesensis*, *A. stellata var. amoea*, *A. stellata var. deckeri*, *A. stellata var. fatuhivensis*, *A. stellata var. marquesensis*, *A. sulcata*, *A. thozetii*, *A. torresiana*, *Gynopogon apolimae*, *Gynopogon brevipes*, *Gynopogon oliviformis*, *Gynopogon scandens*, *Gynopogon stellatus*, *Gynopogon torresianus*, *Pulassarium obtusifolium*, *Pulassarium oliviformis*, *Pulassarium scandens*, *Pulassarium stellatum*, *Pulassarium sulcatum*, *Pulassarium thozetii*, *Pulassarium torresianum*

oblasti: Havajské ostrovy, Indonésie, Queensland

Roste v jihovýchodní Asii, Austrálii a na Havajských ostrovech v podobě keře nebo polokeře. Je to velmi variabilní druh. Dorůstá výšky až 8m při průměru kmínku 2cm. Listy obvykle vyrůstají v 4četných přeslenech, mají kopinatý tvar a délku do 8cm. Květenství bývá 3 - 4četné a vlastní květy jsou oranžové a dlouhé 8mm.

### *Alyxia sulana*

### *Alyxia taiwanensis*

oblasti: JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě šplhavého keře. Větve jsou ochlupené. Listy jsou vstřícné nebo 3 -

4četně přeslenité, eliptické, kožovité, špičaté, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1 - 1,5cm, báze je špičatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Kvete ve vrcholíku složeném ze svazečků, vlastní květy mají trubku délky 4 - 5mm a kališní lístky délky 2 - 3mm. Plody jsou vejčité, dlouhé 6m a průměru 4mm.

### Alyxia tetanifolia

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

### Alyxia tetraquetra

### Alyxia thailandica

oblasti: Thajsko

### Alyxia tisserantii

synonyma: A. affinis, A. breviflora, A. celastrinea, A. diellipticocarpa, A. discolor, A. disphaerocarpa, A. dolioliflora, A. doratophylla, A. microbuxus, A. microcarpa, A. myrtoides, A. nummularia, A. obovata, A. pseudoserpentina, A. rosmarinifolia, A. spathulata, Gynopogon celastrinus, Gynopogon labillardierei, Gynopogon microbuxus, Gynopogon rosmarinifolius, Pulassarium affine, Pulassarium brevifolium, Pulassarium disphaerocarpum

### Alyxia torquata

synonyma: Gynopogon torquatus

### Alyxia torresiana

### Alyxia tropica

synonyma: A. ruscifolia subsp. tropica

oblasti: Severní teritorium

Roste v Austrálii.

### Alyxia uniflora

### Alyxia veillonii

## Alyxia vera

### Alyxia villilimba

synonyma: A. villilimba var. macrophylla

oblasti: Guangxi, Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy bývají 3četně přeslenité, eliptické, dlouhé 7 - 20cm, široké 1,5 - 4,5cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Kvete ve vrcholících v paždí listů na 2 - 4cm stopce, listeny jsou vejčité, vlastní květy jsou bílé a koruna má průměr 1,5mm. Plody mají délku 2,5cm a průměr 1cm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1417>

<https://www.rostliny.net/>