

Hylomecon

čeleď: Papaveraceae

Hylomecon japonica

synonyma: *Chelidonium japonicum*, *H. japonica* var. *japonica*, *Stylophorum japonicum*

oblasti: Japonsko, Korea, S Čína, Střední Čína, SV Čína, V Čína, V Sibiř

Roste v Číně a na Sibiři v trsech. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 40)cm. Při poranění roní žlutou tekutinu. Stonek je řídce dlouze ochlupený. Přízemní listy jsou kopinaté, peřenosečné nebo zpeřené s (3 -) 5 (i 7)mi lístky, asymetricky vroubkované, řapíkaté a lodyžních listů bývá max. 2ks anebo zcela chybí. Kvete po 1 - 3ks žlutými 4četnými květy o průměru 3,5 - 5cm a kališní lístky brzy opadávají. Plodem je řídce dlouze ochlupená tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *dissecta*
- var. *japonica*
- var. *subincisa*

Vyhovují mu chladná místa s vlhkou půdou bohatou na živiny a stín.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Hylomecon vernalis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hylomecon-japonica/>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Hylomecon.htm>

<https://www.rostliny.net/>