

Schizachyrium tenerum

synonyma: *Andropogon campestris*, *Andropogon feensis*, *Andropogon gracilis*, *Andropogon hirtiflorus* var. *feensis*, *Andropogon imberbis* var. *incertus*, *Andropogon leptophyllus*, *Andropogon luxurians*, *Andropogon myosurus*, *Andropogon myosurus* var. *feensis*, *Andropogon neesii*, *Andropogon preslii*, *Andropogon schottii*, *Andropogon tabina*, *Andropogon tener*, *Andropogon tener* var. *dubius*, *Andropogon tener* var. *neesii*, *Andropogon tener* var. *pilosus*, *Elionurus dubius*, *Schizachyrium biciliatum*, *Schizachyrium feense*, *Schizachyrium filiforme*, *Schizachyrium myosurus*, *Schizachyrium schottii*, *S. var. filiforme*, *S. var. scabriglume*, *Schizachyrium weberbaueri* var. *minus*, *Sorghum campestre*, *Sorghum myosurus*, *Sorghum schottii*, *Sorghum tenerum*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Amerika, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Portoriko, Texas

Roste v Severní, střední i Jižní Americe. Dorůstá výšky až 1m. Stonek je vzpřímený. Listy jsou dlouhé 15 - 20cm.

<https://www.rostliny.net/>