

Baccharis tricuneata

synonyma: *Baccharis cuneifolia*, *Baccharis magellanica*, *Baccharis mucuchiesensis*, *Baccharis prostrata* var. *lineata*, *Baccharis tolimensis*, *B. var. magellanica*, *B. var. paramorum*, *Baccharis tridentata*, *Baccharis variifolia*, *Conyza magellanica*, *Conyza tricuneata*, *Erigeron tricuneatus*, *Pentaphorus glutinosus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Argentina, Čile, Falklandy, Ohňová země

Roste v Čile, Argentině, Ohňové zemi a na Falklandských ostrovech v podobě stálezeleného nízkého plazivého keře. Dorůstá výšky 20 - 25 (i 30)cm. Větve jsou v mládí lepivé a žláznaté. Listy jsou střídavé, holé, špičaté, kopistkovité, dlouhé 4 - 9mm, široké 2 - 4 (i 4,5)mm, v mládí lepivé na vrcholu 1 - 2 páry tupých zubů. Kvete v samostatných přisedlých nebo krátce stopkatých bílých nebo a úborech s průměrem 0,4 - 1,2m. Plodem je 2mm nažka s 4 - 7mm chmýrem.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>