

Thymus praecox (Mateřídouška časná)

synonyma: *Thymus serpyllum* subsp. *praecox*, *Thymus serpyllum* var. *praecox*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Britská Kolumbie, Česká republika, Georgia, Grónsko, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v podobě nízkého půdokryvného keříku s plazivými tupě 4hrannými stonky. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy mohou být mírně chlupaté. Kvete ve stažených lichoklasech růžovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albiflorus' - květy bílé
- subsp. *arcticus*
- 'Languinosus'
- 'Hall's Woolly'

- subsp. *britannicus*
- subsp. *caucasicus*/T. *caucasicus*
- subsp. *grossheimii*
- subsp. *jankae*
- 'Minor' - výška do 5cm; listy jemně plstnaté
- subsp. *parvulus* - endemit Itálie
- subsp. *polytrichus*/T. *polytrichus*
- subsp. *praecox* (Mateřídouška časná pravá) - výška 3 - 20cm; listy bývají kopist'ovité, vejčité nebo obvejčité, ochlupené s nápadnou žilnatinou, na fertálních větvích má různou velikost i tvar, dolní mají delší řapík a kratší čepel, pod květenstvím jsou prakticky přisedlé a horní pár žilek na konci listu se spojuje v krátkou vrcholovou žilku na lemu; květy mají kališní cípy kopinaté, delší než široké; skalky a volná hlinitá místa
- 'Doone Valley'
- 'Minus'
- 'Pseudolanuginosus'/T. *britannicus* - plstnaté listy

- 'Red Carpet' - květy růžové
- 'Whirral White' - květy bílé
- subsp. *widderi*
- subsp. *zygiformis*

Vyhovují jí kamenité stráně, ideálně vápencové i hadce a dobře propustný substrát.

Množí se dělním trsů.

<https://www.rostliny.net/>