

Mundulea sericea

synonyma: *Cytisus sericeus*, *Dalbergia sericea*, *Mundulea suberosa*, *Robinia senoides*, *Robinia suberosa*, *Tephrosia sericea*, *Tephrosia suberosa*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Indie, Jihoafrická Republika (JAR), Malawi, Mosambik, Srí Lanka, Zambie, Zimbabwe

Roste v tropické Africe, Indii a Srí Lance v podobě nízkého keře až stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 2 (i 7,5)m. Borka je šedá nebo nažloutlá a korkovitá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 3 - 10ti páry lístků, vlastní lístky zelené, lesklé, mírně vejčité, tupě špičaté, přitiskle ochlupené, dlouhé 1,5 - 6,5cm, široké 1 - 2,5cm a řapíčky jsou krátké. Kvete v nepravém hroznu s délkou (3 -) 8 - 14cm, šířky 5 - 8mm, s modrými až růžovofialovými květy s kalichem délky 6mm a pavézou délky 1,8cm a šířkou 1,5cm. Plodem je lusk délky 4 - 9cm, šířky 5 - 8mm, obsahující 4 - 9 (i 15) ledvinovitých žlutohnědých ochlupených semen délky 4mm a šířky 3mm.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>