

Centropogon granulosus

synonyma: *Centropogon aggregatus*, *Centropogon aggregatus* var. *cardinalis*, *Centropogon augostanus*, *Centropogon cardinalis*, *Centropogon casapiensis*, *Centropogon chrysostoma*, *Centropogon cumulatus*, *Centropogon cuspidatus*, *Centropogon densiflorus* var. *lugens*, *Centropogon erastus*, *C. f. cardinalis*, *C. subsp. lateriflorus*, *C. var. aggregatus*, *C. var. cuspidatus*, *C. var. rutilus*, *Centropogon holtonis*, *Centropogon holtonis* var. *albanensis*, *Centropogon lateriflorus*, *Centropogon nutans*, *Centropogon panamensis*, *Centropogon parvulus*, *Centropogon planchonis* var. *heteranthus*, *Centropogon tortilis*, *Centropogon vinosus*, *Centropogon warszewiczii*, *Siphocampylus aggregatus*

čeleď: Campanulaceae

oblasti: Bolívie, Kostarika, Peru

Roste od Kostariky po Bolívii v podobě liánovité vytrvalé bylinky. Dokáže růst i jako epifyt. Dorůstá délky do 2,5m. Stonek je dutý a v průměru má do 1,5cm. Listy jsou mírně vejčité, drobně zubaté, špičaté, zelené, dlouhé 10 - 20 (i 28)cm, široké 6 - 14cm a řapíkaté. Květenstvím je terminální hrozen, stopky jsou min. na konci hrbovaté, vlastní květy mají korunu délky 3 - 4cm v barvě červenooranžové, vrchní pysk je žlutooranžový a kališní lístky jsou 3úhlé, dlouhé 3mm. Plodem je eliptická bílá bobule průměru 1 - 1,5cm.

Vyhovují ji vlhké mlžné lesy.

<https://www.rostliny.net/>