

## Koeleria pyramidata (Smělek jehlancovitý)

synonyma: *Aira gracilis*, *Dactylis paleacea*, *Koeleria ciliata*, *Koeleria ciliata* f. *rigidiuscula*, *Koeleria ciliata* var. *rigidiuscula*, *Koeleria cristata* var. *montana*, *Koeleria cristata* var. *pyramidata*, *Koeleria exaltata*, *Koeleria genevensis*, *Koeleria gigantea*, *Koeleria glabra*, *Koeleria grandis*, *Koeleria grandis* var. *gacilescens*, *Koeleria interrupta*, *Koeleria kernerii*, *Koeleria lamarckii*, *Koeleria macrantha* var. *montana*, *Koeleria macranthera*, *Koeleria mollis*, *Koeleria mollis* var. *rigidiuscula*, *Koeleria montana*, *Koeleria polonica*, *K.* subsp. *montana*, *K.* var. *ciliata*, *K.* var. *danica*, *K.* var. *rigidiuscula*, *Koeleria tristis*, *Poa pyramidata*

čeleď: Poaceae

oblasti: Česká republika, Itálie, Karpaty, Katalánsko, Německo, Polsko, Švýcarsko, V Evropa

Pochází ze severní a východní Evropy. Dorůstá výšky 0,30 - 0,6 (i 1)m. Lodyžní listy bývají ploché, holé, široké 2 - 3mm, na bázi a na okraji mají 0,5 - 1,5mm brvy a pochvy jsou holé, občas nejspodnější krátce ochlupené. Květenstvím je přechod mezi lichoklasem a úzkou jehlancovitou latou, klásky jsou 2 - 5tikvěté a dlouhé 5,5 - 7mm.

Vyhovují mu i sušší půdy s menším obsahem živin.

<https://www.rostliny.net/>