

Melica ciliata (Strdivka brvitá)

synonyma: *Arundo ciliata*, *Beckeria ciliata*, *Beckeria montana*, *Claudia ciliata*, *Dalucum ciliatum*, *Lasiagrostis variegata*, *Melica balansae*, *Melica bauhinii*, *Melica bossieri*, *Melica caespitosa*, *Melica cappadocica*, *Melica chrysolepis*, *M. f. aequiglumis*, *M. f. flavescens*, *M. f. glabrata*, *M. f. latifolia*, *M. f. pappii*, *M. f. violacea*, *M. subsp. glauca*, *M. subsp. magnolii*, *M. subsp. micrantha*, *M. subsp. monticola*, *M. subsp. nebrodensis*, *M. subsp. taurica*, *M. var. aequiglumis*, *M. var. brachyantha*, *M. var. chrysolepis*, *M. var. elata*, *M. var. flavescens*, *M. var. glabrata*, *M. var. major*, *M. var. micrantha*, *M. var. nebrodensis*, *M. var. taurica*, *M. var. tomentella*, *M. var. varia*, *M. var. violacea*, *M. var. vulgaris*, *Melica colorata*, *Melica cretica*, *Melica cristata*, *Melica flavescens*, *Melica glauca*, *Melica laxiflora*, *Melica linnaei*, *Melica lutescens*, *Melica magnolii*, *Melica micrantha*, *Melica monticola*, *Melica nebrodensis*, *Melica nebrodensis var. magnolii*, *Melica provincialis*, *Melica pubescens*, *Melica simulans*, *Melica taurica*, *Melica taurica subsp. monticola*, *Melica tinei*, *Melica transsilvanica var. glabrata*, *Melica typhina*, *Verinea pterostachys*

čeleď: Poaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Írán, Itálie, JZ Rusko, Katalánsko, Kazachstán, Korsika, Kréta, Libanon, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Moldávie, Německo, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Skandinávie, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Washington

Pochází ze severní Afriky, střední a jižní Evropy. Patří mezi trvalky a roste v trsech. Dorůstá výšky 20 - 70 (i 90)cm. Barva je šedozelená a povrch holý. Stébla jsou přímá, tenká, v horní části drsná. Listy mají šířku 1 - 4mm, bývají svinuté, tuhé, šedozelené, holé s až 4mm a pochvy všech listů jsou holé. Kvete v bílých nebo našedlých kláscích vytvářející řidší lichoklas délky 4 - 8 (i 20)cm. Plodem je světlebéžová obilka. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ciliata*/var. *ciliata* (Strdivka brvitá pravá)
- subsp. *magnolii*
- var. *micrantha*

Vyhovuje jí suchá vápnitá půda, stepi, křoviny atp. a plné slunce nebo polostín.

<https://www.rostliny.net/>