

Panicum capillare (Proso vláskovité)

synonyma: Chasea capillaris, Leptoloma barbipulvinata, Leptoloma capillaris, Milium barbipulvinatum, Milium capillare, Panicum acutifolium, Panicum barbipulvinatum, Panicum barbipulvinatum var. hirsutipes, Panicum bobartii, P. subsp. barbipulvinatum, P. subsp. capillare, P. var. agreste, P. var. barbipulvinatum, P. var. brevifolium, P. var. capillare, P. var. occidentale, P. var. vulgare, Panicum elegantulum, Panicum riparium

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Andalusie, Arizona, Arkansas, Balúčistán, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jamajka, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v USA, Jamajce jako jednoletka v řídkých trsech a zavlečené bylo do Pákistánu. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 50 (i 80)cm. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 7 - 30cm a široké 0,5 - 1,4cm. Květenstvím je volná široce vejčitá až široce podlouhlá lata délky 15 - 50cm, klásky jsou eliptické nebo podlouhlé, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 1,8 - 2,5 (i 3,5)mm, mají vláskovitě jemnou stopku délky 1 - 2cm a dolní pleva má délku max. 1/2 klásku. Obilky jsou bledě šedé až nažloutlé.

<https://www.rostliny.net/>