

## Spartina alterniflora

synonyma: *Dactylis fasciculata*, *Limnetis glabra*, *S. var. glabra*, *S. var. pilosa*, *Spartina brasiliensis*, *Spartina dissitiflora*, *Spartina fasciculata*, *Spartina glabra*, *Spartina glabra var. alterniflora*, *Spartina glabra var. pilosa*, *Spartina laevigata*, *Spartina maritima f. gracilis*, *Spartina maritima subsp. glabra*, *Spartina maritima var. alterniflora*, *Spartina maritima var. brasiliensis*, *Spartina maritima var. glabra*, *Spartina merrillii*, *Spartina stricta var. alterniflora*, *Spartina stricta var. glabra*, *Spartina stricta var. maritima*, *Spartina x merrillii*, *Trachynotia alterniflora*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Oregon, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie, Washington

Pochází z východu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky, ale listy na zimu opadávají. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou dlouhé 20 - 60cm a široké 1,5cm při jejich bázi.

Vyhovují jí vlhká místa, obzvláště slané mokřady.

<https://www.rostliny.net/>