

Colquhounia

čeleď: Lamiaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest skotského sběratele Roberta Colquhouna. Roste o Himálaje přes Čínu po Malajský poloostrov v podobě stálezeleného nebo částečně stálezeleného keře či polokeře. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 4)m. Větve jsou 4hranné. Listy jsou vstřícné, drobně zubaté, dlouhé 3 - 12cm, široké 1 - 6cm aromatické. Květy jsou dlouze trubkovité a 2pyské, koruna žlutá až růžovofialová se 4mi tyčinkami a jsou seskupené v chudých lichopřeslenech.

Vyhovuje ji plné slunce, dobře propustná půda a chráněné místo. Částečně je mrazuvzdorná.

Množí se semeny nebo řízkami.

Colquhounia coccinea

oblasti: Arunáčalpraděš, Ásám, Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Thajsko, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Bhútánu, Číně, Myanmaru, Indii, Nepálu a Thajsku v podobě mírně rozkladitého keře. Dorůstá výšky 2 (i 4,5)m. Větve jsou v mládí dřevité pouze částečně, 4hranné a drobně ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, vroubkované, špičaté, dlouhé 7 - 15cm, báze je kulatá až srdčitá a spodní strana plstnatá. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou dlouze trubkovité, oranžovočervené, na max. 1mm stopce, s 6mm dlouhým hvězdicovitě ochlupeným kalichem a 2 - 2,5cm korunou s 1,7 - 2,3cm dlouhou trubkou v 6 - 20tičetných lichopřeslenech. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *coccinea* - Čína, Bhútán, Indie, Nepál - větve s listy řídce rezavě hněvdicovitě ochlupené
- var. *mollis*/C. *mollis*/C. *tomentosa*/C. *vestita* var. *rugosa* - Čína, Bhútán, Indie, Myanmar, Nepál, Thajsko; větve a listy hustě rezavě hvězdicovitě plstnaté

Colquhounia compta

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí hustě šedě plstnaté. Listy jsou vejčité, plstnaté, vroubkované, špičaté, dlouhé 4 - 5cm, široké 2,5 - 3cm, báze uťatá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Květy v chudých vrcholcích, vlastní květy mají kalich délky 7mm, korunu tmavě šedočervenou až tmavěčervenou a trubka je dlouhá 1,6cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *compta* - Yunnan; koruna tmavě šedočervená, dlouhá do 2,5cm, horní pysk celokrajný
- var. *mekongensis*/C. *mekongensis* - Sichuan, Yunnan; kališní lístky 3úhle šídlovité, koruna tmavěčervená, dlouhé 3 - 3,5cm a horní pysk vykrojený

Colquhounia elegans

synonyma: *C. martabanica*

oblasti: Kambodža, Laos, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Myanmaru, Thajsku, Vietnamu, Laosu a Kambodži v podobě keře. Dorůstá výšky 1 -

3m. Listy jsou eliptické, ochlupené, špičaté, dlouhé 4,5 - 8,5cm, široké 2 - 4cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství tvoří chudé vejčité lichopřesleny délky 2 - 3cm, listence jsou dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy mají stopky délky 1 - 2mm, kalich délky 6 - 9mm, koruna je žlutá až červená, dlouhá 2,5 - 2,8mm a trubka má délku 2,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *elegans* - Yunnan, Myanmar, Thajsko; povrch hustě ochlupený; květy mají kalich délky 9mm, korunu délky 2,8cm
- var. *tenuiflora*/C. *tenuiflora* - Yunnan, Kambodža, Laos, Myanmar, Thajsko, Vietnam; povrch řídce ochlupený; květy mají kalich délky 6mm a korunu délky 2,5cm

Colquhounia seguinii

synonyma: *Caryopteris fluminis*, *C. decora*, *C. elegans* var. *pauciflora*

oblasti: Guangxi, Guizhou, Hubei, Myanmar (Barma), Sichuan, Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Větve jsou hustě jemně ochlupené. Listy jsou úzce vejčité, tmavězelené, jemně pilovité, špičaté, dlouhé 2,5 - 11cm, široké 1 - 5,5cm, spodní strana je hustě ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 4,5cm. Květenství má délku 3 - 4cm, tvoří jej 2 - 6tičetné lichopřesleny, vlastní květy mají listeny délky 1 - 1,5cm, stopky jsou dlouhé 2 - 3mm, kalich má délku 5mm, koruna je žlutá až růžovofialová, dlouhá 2cm, trubka je dlouhá 1,2cm a horní pysk má délku 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *pilosa* - Sichuan, Yunnan; větve vločkovitě ochlupené; listy huňaté
- var. *seguinii*/C. *decora*/C. *elegans* var. *pauciflora*/C. *fluminis* - Čína, Myanmar; větve hustě jemně ochlupené; listy řídce ochlupené, více na spodní straně na žilnatině

Colquhounia vestita

synonyma: *C. coccinea* var. *vestita*

oblasti: Ásám, Bhútán, Himálaj, Nepál, S Indie, V Indie, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Bhútánu, Nepálu a Himálaji v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1,5 - 3m. Větve jsou v mládí hustě šedě plstnaté. Listy jsou vejčité, tmavězelené, hustě plstnaté, drobně vroubkované, špičaté, dlouhé 5,5 - 12cm, široké 2 - 6cm, báze zaoblená až srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 1,5cm. Květenství tvoří 6 - 10tičetné lichopřesleny v hroznovitých klasech, vlastní květy mají 1mm stopku, kalich trubkovitý, dlouhý 1,2 - 1,5cm, cípy dlouhé 1,5 - 2mm, koruna je červenooranžová, dlouhá 2,5cm, trubka má délku 2cm a horní pysk je vejčitý.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1097>

<https://www.rostliny.net/>