

Sporobolus pungens (Sporobolus pichlavý)

synonyma: *Agrostis affinis*, *Agrostis arenaria*, *Agrostis pungens*, *Phalaris disticha*, *Podosemum pungens*, *Sporobolus arenarius*, *Sporobolus muhlenbergii*, *Sporobolus purgans*, *Sporobolus virginicus* var. *arenarius*, *Vilfa arenaria*, *Vilfa muhlenbergii*, *Vilfa pungens*

čeleď: Poaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Austrálie, Baleáry, Chorvatsko, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste v tropech a ve středozeší jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří odnožující dlouhé výběžky. Povrch je šedozelený. Stébla jsou žlábkovitá a mohou být krátce větvená. Listy jsou 2řadé, čárkovité, špičaté, zpravidla žlábkovité, ochlupené, dlouhé 2 - 8cm a místo jazýčku je řada chlupů. Květenstvím je lata délky 3 - 6cm, klásky jsou stopkaté, 1květé, zelené nebo nafialovělé a dlouhé 2,5 - 3mm. Plodem je obilka.

Roste na plážích, dunách a mokřadech.

<https://www.rostliny.net/>