

Frankenia hirsuta (Frankenie chlupatá)

synonyma: *Franca corymbosa*, *Franca hispida*, *Franca laevis*, *Franca nothria*, *Franca revoluta*, *Franca thymifolia*, *Franca velutina*, *Frankenia aucheri*, *Frankenia bianorii*, *Frankenia canescens*, *Frankenia capitata*, *Frankenia ericoides*, *F. subsp. intermedia*, *Frankenia hispida*, *Frankenia intermedia*, *Frankenia laevis subsp. hirsuta*, *Frankenia narynensis*, *Frankenia pilosa*, *Frankenia revoluta*, *Nothria hirsuta*

čeleď: Frankeniaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Egypt, Francie, Írán, Itálie, Izrael, J Afrika, JZ Rusko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Moldávie, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Střední Asie, Sýrie, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Roste ve středozemí, střední Asii a jižní Africe v podobě polokeře. Stonky jsou rozkladité, poléhavé, červené a dlouhé do 30cm. Listy vyrůstají ve svazečcích, téměř v přeslenech, jsou podlouhlé, tupé, zdužnatělé, podvinuté, bíle tečkované a dlouhé 3 - 7mm. Kvete drobnými 5tičetnými květy na koncích větví, korunní lístky jsou obvejčité, na bázi klínovité, růžové až bílé a dlouhé 4 - 6mm. Plodem je tobolka s vytrvalým kalichem.

Vyhovují ji kamenité i písčité pobřeží, mokřady a slaniska.

<https://www.rostliny.net/>