

# Launaea aspleniifolia

synonyma: Ammoseris aspleniifolia, Chondrilla aspleniifolia, Microrhynchus aspleniifolius, Prenanthes aspleniifolia, Rhabdotheca aspleniifolia

čeleď: Asteraceae

oblasti: Bangladéš, Bhútán, Indie, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán

Roste v Pákistánu, Indii, Myanmaru, Nepálu, Bhútánu, Bangladéši a Laosu jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Stonek je větvený a větve jsou rozkladité nebo vystoupavé. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou obvejčité až lžičkovité, zubaté peřenosečně vykrajované, dlouhé 3 - 12cm, široké 1 - 4cm, laloky jsou špičaté, lodyžní listy jsou podobné, ale menší a vrcholové, jsou vejčité až špičaté. Květenstvím je žlutý úbor z 16 - 25ti květů na 1 - 2cm stopce, zákrov je válcovitý, dlouhý 0,8 - 1cm, vnějších zákrovních lístků je 8 - 10, jsou vejčité, dlouhé 1 - 2mm, střední jsou kopinaté, mírně delší, vnitřních je 7 - 8ks, jsou úzce kopinaté, dlouhé 0,8 - 1,2cm, široké 1,5 - 2mm, okvětní lístky jsou dlouhé 6 - 7,5mm a terčové květy jsou dlouhé 6 - 7mm. Plodem je hnědá nažka délky 1,6 - 2,4mm s chmýrem délky 0,8 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>