

Launaea capitata

synonyma: *Chondrilla capitata*, *Launaea glomerata*, *Lomatolepis glomerata*, *Microrhynchus glomeratus*, *Sonchus capitatus*, *Sonchus mareoticus*, *Zollikoferia glomerata*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Alžírsko, Arabský poloostrov, Balúčistán, Egypt, Eritrea, Írán, Libye, Makaronésie, Maroko, Mauretánie, Palestina, Sindh, Súdán, SZ Indie, Tunisko, Západní Sahara

Roste od Kanárských ostrovů přes severozápadní Afriku po Pákistán a Indii v podobě rozkladité až vystoupavé byliny. Dorůstá výšky do 40cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou podlouhlé až lžičkovité, peřeně laločnaté, dlouhé 2 - 16cm, široké 0,5 - 5,5cm, báze je sbíhavá a laloky jsou bíle zubaté. Květenstvím je 25 - 50tkvětý úbor ve svazcích po (2 -) 5 - 8ks na max. 5mm stopce, zákrov je válcovitý až kulovitý, 3 - 4řadý, dlouhý 0,8 - 1,2cm, vnější zákrovní lístky jsou široce vejčité, špičaté, dlouhé 2 - 3,5mm, střední v počtu 12 - 16ks úzce kopinaté, nestejně, dlouhé 2 - 7mm, vnitřních v počtu 8 kopinaté, dlouhé 0,8 - 1,2cm, široké 2,5 - 3,5mm, okvětní lístky jsou dlouhé 5 - 6,5mm, terčové květy jsou žluté a dlouhé 4,5 - 6mm. Plodem je světlá nažka délky 3 - 4,3mm s 5ti hlavními rýhami, 10ti vedlejšími a chmýrem délky 4 - 7mm.

<https://www.rostliny.net/>