

Launaea fragilis

synonyma: *Atalanthus candolleanus*, *Atalanthus longilobus*, *Lactuca fragilis*, *Launaea chondrilloides*, *Launaea longiloba*, *Launaea longiloba*, *Launaea resedifolia* subsp. *longiloba*, *Launaea resedifolia* var. *dichotoma*, *Launaea resedifolia* var. *pulchella*, *Launaea resedifolia* var. *setacea*, *Launaea tenuiloba*, *Microrhynchus chondrilloides*, *Rhabdotheca candolleana*, *Rhabdotheca chondrilloides*, *Rhabdotheca longiloba*, *Scorzonera chondrilloides*, *Sonchus candolleanus*, *Sonchus chondrilloides*, *Zollikoferia chondrilloides*, *Zollikoferia longiloba*, *Zollikoferia mucronata* var. *latisecta*, *Zollikoferia resedifolia* var. *longiloba*, *Zollikoferia resedifolia* var. *minor*, *Zollikoferia resedifolia* var. *setacea*, *Zollikoferia resedifolia* var. *viminea*, *Zollikoferia tenuiloba*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Itálie, Izrael, Katalánsko

Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou střídavé, zubaté až peřenolaločné. Květenstvím je úbor, zákrov má délku 1 - 1,5 (i 1,7)cm a šířku 4,5 - 7mm. Plodem je nažka délky 5,5 - 6,5mm s chmýrem délky 0,8 - 1,1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *fragilis*
- subsp. *pumila*

<https://www.rostliny.net/>