

Launaea procumbens

synonyma: Ammoseris patens, Brachyramphus obtusus, Launaea fallax, Launaea procumbens, Microrhynchus arabicus, Microrhynchus fallax, Microrhynchus patens, Paramicrorhynchus procumbens, Prenanthes procumbens, Sonchus lakouensis, Sonchus leucodon, Youngia procumbens, Zollikoferia fallax, Zollikoferia leucodon

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Arabský poloostrov, Egypt, Indie, Irák, Írán, JZ Čína, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Roste od Egypta po Čínu a Myanmar v podobě rozkladité až vystoupavé trvalky. Dorůstá délky 10 - 40cm. Stonek je asymetricky větvený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou lžičkovité, zubaté až peřenolaločné na 6 - 8 3úhlých laloků, bíle zubaté, dlouhé 2 - 26cm, široké 0,5 - 5cm, báze je sbíhavá, lodyžní listy jsou menší a vrcholové přeměněné v listeny. Květenstvím je 16 - 27mikvětý úbor na 0,2 - 0,8 (i 1)cm stopce, zákrov je válcovitý, 3 - 4řadý, dlouhý 0,8 - 1,2cm, vnějších zákrovních lístků je 10 - 14, jsou nestejně, dlouhé 1 - 6mm, vnitřních bývá 8, okvětní lístky jsou dlouhé 6 - 9mm a terčové 5 - 7,5mm. Plodem je nažka délky 1,5 - 4,5mm se 4mi rýhami a chmýrem délky 5 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>