

## Launaea secunda

synonyma: *Chondrilla secunda*, *Microrhynchus secundus*, *Zollikoferia secunda*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Indie, Nepál, Pákistán

Roste v Afganistánu, Pákistánu, Indii a Nepálu jako trvalka. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Stonek může být větvený, vystoupavý až vzpřímený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou lžičkovité, asymetricky peřenaločné, dlouhé 7 - 25cm, široké 1,5 - 10cm, laloky jsou až špičaté, horní listy jsou eliptické až kopinaté, přisedlé, zakulacené, vrcholové pak zakrnělé až vejčité a špičaté. Květenstvím je 8 - 14tkvětý úbor na 0,2 - 1,3cm stopce s lodyhou délky až 30cm, zákrov je úzce válcovitý, 2 - 3řadý, dlouhý 0,8 - 1cm, vnější zákrovní lístky v počtu 6 - 9ks jsou malé, špičaté, vnitřních je 8, jsou úzce kopinaté, dlouhé 0,8 - 1cm, okvětní lístky jsou dlouhé 5 - 6mm. Plodem je nažka délky 3 - 5mm se 4mi primárními rýhami, 8mi sekundárními a chmýr má délku 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>