

## Micromeria imbricata

synonyma: *Clinopodium imbricatum*, *Micromeria biflora* var. *cinereotomentosa*, *Micromeria biflora* var. *hirsuta*, *Micromeria biflora* var. *punctata*, *Micromeria forsskalii*, *Micromeria microphylla* var. *imbricata*, *Micromeria microphylla* var. *remota*, *Micromeria neumannii*, *Micromeria ovata*, *Micromeria ovata* var. *cinereotomentosa*, *Micromeria perrottetii*, *Micromeria punctata*, *Micromeria purtschelleri*, *Micromeria quartiniana*, *Micromeria schimperi*, *Satureja biflora* var. *cinereotomentosa*, *Satureja contardoii*, *Satureja imbricata*, *Satureja ovata*, *Satureja ovata* var. *cinereotomentosa*, *Satureja punctata*, *Satureja punctata* subsp. *ovata*, *Satureja punctata* var. *rigida*, *Satureja quartiniana*, *Satureja remota*, *Satureja schimperi*, *Thymus cavaleriei*, *Thymus imbricatus*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Eritrea, Jemen, Jihoafrická Republika (JAR), Kamerun

Roste od JAR po Arabský poloostrov v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Větve jsou přímé nebo vystoupavé a mohou být ochlupené. Listy jsou vstřícné, podlouhlé, kožovité, celokrajné, podvinuté, špičaté, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 2 - 5,5mm a řapíky jsou krátké. Květenstvím je až 20tičetný lichopřeslen či vidlan, má listeny, vlastní květy růžové, kalich trubkovitý, koruna 2pyská a dlouhá 0,6 - 1cm. Plodem je tvrdka. Je aromatický.

Vyhovují mu suché kamenité půdy.

<https://www.rostliny.net/>