

Liatris spicata (Šušarda klasnatá)

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína , Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky jako trvalka. Pod zemí vytváří hlízovitý oddenek. Vytváří přízemní růžici z listů dlouhých 15cm, lodyžní listy jsou bohaté, úzce kopinaté, dlouze špičaté a tmavě zelené. Kvete růžovými nebo bílými drobnými květy v hustém klasu rozkvétajícím postupně směrem dolů na 50 - 70 (i 90)cm stvolu. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé
- 'Floristan Violet' - výška 60 - 80cm; květy modrofialové
- 'Floristan Weib' - výška 90cm
- 'Floristan White' - bílé květy
- 'Kobold' - výška 40 - 50cm; květy růžové
- 'Kobold Original' - výška 40cm

Vyhovuje jim lehká stále dobře propustná sušší půda bohatá na živiny, travnaté louky i svahy a přímé slunce. Na zimu se nezalévá.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

<https://www.rostliny.net/>