

Calophyllum brasiliense

synonyma: *C. subsp. mariae*, *C. var. burchellii*, *C. var. elongatum*, *C. var. gardneri*, *C. var. spruceana*, *Calophyllum lucidum*, *Calophyllum mariae*, *Calophyllum piaroanum*, *Calophyllum revolutum*

čeleď: Calophyllaceae

oblasti: Amazonas, Belize, Bolívie, Chiapas, Ekvádor, Florida, Guatemala, Havajské ostrovy, Hispaniola, Jamajka, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Salvador, Venezuela

Roste ve střední Americe až Brazílii v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 50)m při průměru kmene do 1,8m. Listy jsou vstřícné, eliptické, kožovité, holé, lesklé, tupé až vykrojené, dlouhé 6,3 - 12,5cm, široké 3,2 - 6,3cm, spodní strana je bledší a mají řapíky. Květenstvím je úžlabní hrozen délky 2,5 - 9cm, vlastní květy mají v průměru 1 - 1,3cm, kališní lístky jsou 4 a mají bílou barvu. Plodem je peckovice průměru 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *antillanum*/*C. antillanum*/*C. jacquinii* - Mexiko, střední Amerika, Karibik, Jižní Amerika
- var. *rekoi*/*C. chiapense*/*C. rekoi* - Mexiko až Panama; výška 30m, průměr kmene 1m; listy na fertálních větvích dlouhé 6 - 10cm, na sterilních 15 - 20cm

<https://www.rostliny.net/>