

## Ornithogalum umbellatum (Snědek chocholičnatý)

synonyma: *Hyacinthus umbellatus*, *Ornithogalum affine*, *Ornithogalum angustifolium*, *Ornithogalum boraeum*, *Ornithogalum campestre*, *Ornithogalum cespitium*, *Ornithogalum comosum* subsp. *garganicum*, *Ornithogalum corymbosum*, *Ornithogalum dioscoridis*, *Ornithogalum fasciculatum*, *Ornithogalum garganicum*, *Ornithogalum horologicum*, *Ornithogalum minus*, *Ornithogalum nanum*, *Ornithogalum parviflorum*, *Ornithogalum peyrei*, *Ornithogalum praetextum*, *Ornithogalum preumbellatum*, *Ornithogalum rusticum*, *Ornithogalum stellare*, *Ornithogalum tardans*, *O.* subsp. *campestre*, *O.* var. *angustifolium*, *O.* var. *minus*, *O.* var. *nanum*, *Ornithogalum vulgare*, *Scilla campestris*, *Stellaris corymbosa*

čeleď: Hyacinthaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JZ Asie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Středozemí, SZ Afrika, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze střední a jižní Evropy, severozápadu Afriky a severozápadní a jihozápadní Asie, zavlečen byl do Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Velikost cibule je 1,5 - 3cm v délce a 2 - 3cm v průměru a vytváří (2 -) 5 - 15 dlouze vejčitých vedlejších cibulek s obaly. Dorůstá výšky (7 -) 10 - 25 (i 30)cm. Vytváří 6 lineárních žlábkovitých listů s bílou linkou na vrchní straně. Jejich délka je do 30cm a šířka 8mm. Kvete bílými květy v chocholíku až řídkém chocholičnatém hroznu ve skupinách 6 - 20ks. Rozkvetlé jsou při tom pouze mezi 11. - 15. hodinou. Plodem je tobolka s žebrem výšky do 2mm a s 1 - 15 semeny délky 1,8 - 2,2mm na vodorovné až vystoupavé plodní stopce. Patří mezi chráněné druhy C3. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *divergens* (Snědek rozkladitý)

Vyhovuje mu polostín a vlhká půda v loukách, křovinách, mezích atp.

Množí se dceřinými cibulkami.

Fotografie převzata z <http://www.vkolacek.cz/> .

<https://www.rostliny.net/>