

Vaccinium varingiaefolium

synonyma: *Agapetes varingiaefolia*, *Agapetes vulgaris*, *Diplycosia erythrina*, *Epigynium varingiaefolium*, *Thibaudia varingiaefolia*, *Vaccinium ellipticum*, *Vaccinium erythrinum*, *Vaccinium obversum*, *Vaccinium schimperi*, *V. f. parvifolia*, *V. f. sublanceolata*, *V. var. angustifolium*, *V. var. erythrinum*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Bali, Jáva, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Jávě a Bali v podobě keře o výšce 1 - 5m nebo stromu o výšce 8 (i 20)m s průměrem kmene do 50cm. Větve jsou v mládí narůžovofialové a mohou být ochlupené. Listy jsou vejčité až obvejčité, báze může být mírně lopatkovitá nebo zaoblená, v mládí jsou červené, jinak tmavě zelené, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 0,5 - 2,5cm, spodní strana je řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je úžlabní až terminální hrozen s větvením délky 3 - 8,5cm, vlastní květy mají stopky délky 5 - 9mm, koruna je dlouze baňkovitá, bílá, béžová nebo růžová, uvnitř ochlupená, dlouhá 0,7 - 1,1cm a široká 3 - 7mm. Plodem je kulovitá tmavě růžovofialová až černomodrá bobule průměru 8mm, která může být ochlupená. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *orientale*/*V. lucidum* var. *orientale*/*Vaccinium schimperi* - Jáva; listy hustší, téměř střežovité, eliptické, dlouhé 1 - 2cm, široké 0,5 - 1cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek; květenství ochlupené kromě koruny květů
- var. *varingiaefolium*

<https://www.rostliny.net/>