

Vaccinium viscifolium

synonyma: *Vaccinium decorum*, *Vaccinium perakense*, *Vaccinium subobovatum*, *Vaccinium teysmannii*, *V. var. minus*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Malajský poloostrov, Thajsko

Roste v Thajsku a Malajském poloostrově v podobě keře (i epifytického) až stromu. Dorůstá výšky do 6m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité či lopatkovité, kožovité, tuhé, holé, na spodní straně řídky žláznatě tečkované, celokrajné, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 7cm, žilnatinu tvoří 2 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství tvoří 2 - 5 úžlabních vzpřímených hustých hroznů s 2 - 11cm vřetenem, vlastní květy jsou převislé, mají 3 - 6mm stopku, korunu tmavěružovou až bílou, dlouhou 6 - 7mm a širokou 2,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bicalcaratum* - Malajský poloostrov; listy jsou na vrcholu krátce tupě zúžené
- var. *viscifolium*

<https://www.rostliny.net/>