

Baldellia (Kopinatka)

synonyma: Echinodorus

čeleď: Alismataceae

Pochází z Evropy a severní Afriky. Patří mezi vodní rostliny.

Baldellia alpestris

Baldellia ranunculoides (Kopinatka pryskyřníkovitá)

synonyma: Alisma ranunculoides, Echinodorus ranunculoides

oblasti: Andalusie, Irsko, Itálie, Katalánsko, Newfoundland, Polsko, S Afrika, Švýcarsko, Washington

Pochází z Evropy a severní Afriky. Patří mezi vodní rostliny. V bezmrazých místech dokáže být stálezelená. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 30)cm. Listy mají dlouze kopinatý tvar a vytvářejí růžici. Kvete bílými nebo narůžovělými květy.

Vyhovuje ji teplota v rozmezí 18 - 25°C a měkčí voda s písčitým nebo bahnitým dnem a hloubkou do 5cm.

Množí se pouze semeny a to výsevem do mělké vody s pískem na dně.

Další informace:

[http://akvapedie.cz/kopinatka-pryskyrnikovita_baldellia-ranunculoides-\(echinodorus-ranunculoides\)/](http://akvapedie.cz/kopinatka-pryskyrnikovita_baldellia-ranunculoides-(echinodorus-ranunculoides)/)

<https://www.rostliny.net/>