

Ceratophyllum demersum (Růžkatec ostnity)

čeleď: Ceratophyllaceae
oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jugoslávie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Makedonie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází z tropických vod. Patří mezi trvalky. Délka bohatě větvených stonků dosahuje (0,15 -) 0,2 - 1 (i 3)m a je hustě ve všech směrech porostlá nitkovitými 1 - 2x vidličnatě dělenými tmavězelenými lístky dlouhými 1 - 4cm. Kvete oddělenými mužskými a ženskými květy o velikosti 2mm. Plodem jsou (3,5 -) 4 - 5mm dlouhé, 2,5 - 3mm široké oříšky se 2ma ostny. Patří mezi vzácné chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. apiculatum
- var. inerme

Teplota vody by se měla pohybovat v rozmezí 15 - 30°C. Vyhovuje ji stojatá nebo pomalu tekoucí voda (dokonce i brakická).

Množí se řízkováním.

<https://www.rostliny.net/>