

## Agarista coriifolia

synonyma: *Agarista multiflora* var. *pohlii*, *Agarista neriifolia*, *Agarista pohlii*, *Leucothoe coriifolia*, *Leucothoe crassifolia*, *Leucothoe crassifolia* var. *macrophylla*, *Leucothoe crassifolia* var. *reticulata*, *Leucothoe crassifolia* var. *subreticulata*, *Leucothoe laxiflora* var. *hookeriana*, *Leucothoe laxiflora* var. *martii*, *Leucothoe laxiflora* var. *subcordata*, *Leucothoe neriifolia*, *Leucothoe pohlii*

čeleď: Ericaceae

oblasti: JV Brazílie, V Brazílie

Roste v Brazílii v podob keře až stromu. Dorůstá výšky 3 (i 5)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé až téměř vstřícné, 3četně přeslenité, kožovité, mírně vejčité, špičaté, celokrajné, dlouhé 1,8 - 10,5cm, široké 0,6 - 5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,8cm. Kvete v úžlabních nebo terminálních hroznech či latách s délkou 4,5 - 28cm, vlastní květy mají 2 (i 4) listence, korunu válcovitou až mírně baňkovitou, bílou nebo zelenobílou až červenou, dlouhou 0,7 - 1,1cm a širokou 3 - 6,5mm. Plodem je vejčitá tobolka délky 3 - 6mm a šířky 4,5 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bradei*/*Leucothoe bradei* - jihovýchodní Brazílie; keř; výška do 2m; větve v mládí občas řídce ochlupené; listy podlouhlé až vejčité, dlouhé 2,4 - 7,5cm, široké 0,6 - 3cm, báze klínovitá až zaoblená; květenství má vřeteno délky 2,5 - 20cm, vlastní květy mohou mít stopky ochlupené, korunu červenou, dlouhou 0,8 - 1,1cm

- var. *coriifolia*/*Leucothoe coriifolia* - jihovýchodní Brazílie; keř až strom; výška 3 (i 5)m; větve v mládí občas řídce ochlupené; listy mírně vejčité, dlouhé 1,8 - 10,5cm, široké 0,6 - 5cm, báze srdčitá až zaoblená, řapíky dlouhé 0,2 - 1,8cm; květenství má vřeteno délky 6 - 28cm, vlastní květy mají holé stopky

<https://www.rostliny.net/>