

Eleocharis parvula (Bahnička drobná)

synonyma: Chaetocyperus membranaceus, Chaetocyperus pusillus, Chaetocyperus pygmaeusClavula comosa, Eleocharis leptos var. johnstonii, Eleocharis membranacea, E. f. spongiosa, E. subsp. oppermannii, Eleocharis pygmaea, Eleogiton parvula, Isolepis leptos, Limnochloa parvula, Scirpus leptos, Scirpus parvulus, Trichophorum parvulum

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Střední Amerika, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v Euroasii a v Severní a střední Americe. Nedorůstá vyšší výšky než-li 10cm. Délka květního klásku je pouze 2 - 3mm. Může se využívat jak akvarijní rostlina.

Vyhovují ji brakické nebo slané pomalu tekoucí nebo stojaté vody a telpota v rozmezí 20 - 25°C. Navzdory tomu je i mrazuvzdorná a může se pěstovat v zahradním jezírku.

Množí se dělením trsů.

<https://www.rostliny.net/>