

## Mentha longifolia (Máta dlouholistá)

synonyma: *Mentha aepycaulos*, *Mentha albida*, *Mentha aquatica* var. *gracilis*, *Mentha brevidentata*, *Mentha candicans* f. *angustifolia*, *Mentha candicans* f. *leptostachya*, *Mentha candicans* f. *ramosa*, *Mentha caucasica*, *Mentha cretica*, *Mentha crispa*, *Mentha cuspidata*, *Mentha danubialis*, *Mentha discolor*, *Mentha divaricata*, *Mentha grisella*, *Mentha grisella* subsp. *caucasica*, *Mentha grisella* subsp. *minutiflora*, *Mentha grisella* subsp. *syriaca*, *Mentha incana*, *Mentha incana* f. *barthiana*, *Mentha incana* var. *litoralis*, *Mentha leioneura*, *Mentha lepidioides*, *Mentha longifolia*, M. f. *acutidens*, M. f. *angustifolia*, M. f. *angustifrons*, M. f. *angustissima*, M. f. *anisodons*, M. f. *apentiana*, M. f. *apoxodonta*, M. f. *arthrostachya*, M. f. *comata*, M. f. *densicapilla*, M. f. *flanatica*, M. f. *grinensis*, M. f. *hebosa*, M. f. *heterodons*, M. f. *irregularis*, M. f. *lanyiana*, M. f. *litoralis*, M. f. *magnifrons*, M. f. *melesensis*, M. f. *nicolaensis*, M. f. *niederederi*, M. f. *norica*, M. f. *oblongolanceolatifolia*, M. f. *ochthegena*, M. f. *pahinensis*, M. f. *pascua*, M. f. *paucidentata*, M. f. *planitiensis*, M. f. *prodanii*, M. f. *pustariensis*, M. f. *reticulatinervosa*, M. f. *retinervis*, M. f. *rotundibracteata*, M. f. *schneekapellae*, M. f. *scytina*, M. f. *stenantha*, M. f. *subacutidentata*, M. f. *subalpina*, M. f. *subnemorosa*, M. f. *szolnokensis*, M. f. *trachypriononta*, M. f. *veroniciformis*, M. f. *villocaulis*, M. f. *virens*, M. f. *viridescens*, M. f. *zernestensis*, M. f. *zomborensis*, M. subsp. *aequifrons*, M. subsp. *ambigua*, M. subsp. *balcanica*, M. subsp. *bulgarica*, M. subsp. *buerschiana*, M. subsp. *caucasica*, M. subsp. *diabolina*, M. subsp. *erminea*, M. subsp. *ferdinandii*, M. subsp. *fuliginosa*, M. subsp. *grisella*, M. subsp. *incisifolia*, M. subsp. *javorkae*, M. subsp. *lavandulacea*, M. subsp. *libidinosa*, M. subsp. *minutiflora*, M. subsp. *mollis*, M. subsp. *mollissima*, M. subsp. *ovatifrons*, M. subsp. *pellita*, M. subsp. *procera*, M. subsp. *serrulata*, M. subsp. *submissa*, M. subsp. *syriaca*, M. subsp. *urumovii*, M. var. *acroceraia*, M. var. *acuminata*, M. var. *argenticapilla*, M. var. *bacsensis*, M. var. *balsamiflora*, M. var. *barthiana*, M. var. *bojanaensis*, M. var. *brassoensis*, M. var. *brevifolia*, M. var. *brevifrons*, M. var. *cadilateri*, M. var. *campiensis*, M. var. *campylostachya*, M. var. *candicans*, M. var. *capitata*, M. var. *capitulata*, M. var. *cardibasea*, M. var. *cardiophylla*, M. var. *caucasica*, M. var. *cesarea*, M. var. *chaunanthera*, M. var. *collivaga*, M. var. *crenigena*, M. var. *dejmerii*, M. var. *delphinensis*, M. var. *demissa*, M. var. *densicapilla*, M. var. *diabolina*, M. var. *discolor*, M. var. *divaricata*, M. var. *dobrogensis*, M. var. *dripanoidea*, M. var. *eclytanthea*, M. var. *eisensteiniana*, M. var. *ensidens*, M. var. *erminea*, M. var. *falcatotentata*, M. var. *favratii*, M. var. *feleacaensis*, M. var. *firmicaulis*, M. var. *flaccida*, M. var. *focsaniensis*, M. var. *foroiulensis*, M. var. *gibbosidens*, M. var. *glaucostachya*, M. var. *graciliflora*, M. var. *gracilis*, M. var. *grandis*, M. var. *gulekensis*, M. var. *hapalophylla*, M. var. *holasia*, M. var. *hollosyana*, M. var. *horridula*, M. var. *hugueninii*, M. var. *huteri*, M. var. *incana*, M. var. *ingens*, M. var. *ischnostachya*, M. var. *jurana*, M. var. *kozorensis*, M. var. *laggeri*, M. var. *latibracteata*, M. var. *lavandulacea*, M. var. *leioneura*, M. var. *lepidioides*, M. var. *leptophylla*, M. var. *leptostachya*, M. var. *lereschii*, M. var. *lignosa*, M. var. *ligustrina*, M. var. *lonciana*, M. var. *longifolia*, M. var. *macedonica*, M. var. *macilenta*, M. var. *macrophyllus*, M. var. *major*, M. var. *marisensis*, M. var. *mesomorpha*, M. var. *microphylla*, M. var. *microverticillata*, M. var. *minutiflora*, M. var. *moldovica*, M. var. *mollicoma*, M. var. *mollis*, M. var. *mollissima*, M. var. *montenegrina*, M. var. *mosztongensis*, M. var. *nematostachya*, M. var. *oblongifolia*, M. var. *ochroleuca*, M. var. *pachylodes*, M. var. *pagana*, M. var. *pantotricha*, M. var. *paramecophyllon*, M. var. *pellita*, M. var. *phaeocoma*, M. var. *planitiensis*, M. var. *polystachya*, M. var. *pseudoelongata*, M. var. *pseudoulotricha*, M. var. *ramosissima*, M. var. *reciaensis*, M. var. *recta*, M. var. *reflexifolia*, M. var. *romanica*, M. var. *rozaliae*, M. var. *sedunensis*, M. var. *serbica*, M. var. *seriata*, M. var. *serrulata*, M. var. *sordida*, M. var. *sparsiramea*, M. var. *splendens*, M. var. *stenanthelmia*, M. var. *stenostachya*, M. var. *stenotricha*, M. var. *striata*, M. var. *striatula*, M. var. *subamplexicaulifolia*, M. var. *subincana*, M. var. *subintegra*, M. var. *subintegrifolia*, M. var. *subobtusa*, M. var. *subpyramidaliformis*, M. var. *subpyramidalis*, M. var. *subviridiformis*, M. var. *subviridis*, M. var. *syriaca*, M. var. *szabolcsensis*, M. var. *szamosiana*, M. var. *szeneziana*, M. var. *taphrophila*, M. var. *taurica*, M. var. *tenuior*, M. var. *terasia*, M. var. *trachypriononta*, M. var. *transmota*, M. var. *ulotricha*, M. var. *vallesiaca*, M. var. *vineicola*, M. var. *viridescens*, M. var. *weinerniana*, M. var. *wirzbickiana*, *Mentha marisensis*, *Mentha mellifluens*, *Mentha microcephala*, *Mentha minutiflora*, *Mentha mollis*, *Mentha mollis* f. *leptostachya*, *Mentha mollis* var. *retinervis*, *Mentha mollissima*, *Mentha mollissima* f. *exserta*, *Mentha mollissima* f. *inclusa*, *Mentha mollissima* f.

*plicata*, *Mentha mollissima* var. *bornmuelleri*, *Mentha monticola* var. *jurana*, *Mentha parviflora*, *Mentha pellita*, *Mentha reflexifolia* var. *serrulata*, *Mentha rigens*, *Mentha rotundifolia*, *Mentha sedunensis*, *Mentha spicata* subsp. *longifolia*, *Mentha spicata* var. *longifolia*, *Mentha spicata* var. *longifolia*, *Mentha suaveis*, *Mentha subintegrifolia*, *Mentha sylvestris*, *Mentha sylvestris* f. *minor*, *Mentha sylvestris* f. *pahinensis*, *Mentha sylvestris* subsp. *arctifrons*, *Mentha sylvestris* subsp. *brevifrons*, *Mentha sylvestris* subsp. *lavandulacea*, *Mentha sylvestris* subsp. *mollissima*, *Mentha sylvestris* subsp. *pellita*, *Mentha sylvestris* subsp. *procurrens*, *Mentha sylvestris* subsp. *tomentosa*, *Mentha sylvestris* var. *alpigena*, *Mentha sylvestris* var. *angustifolia*, *Mentha sylvestris* var. *candicans*, *Mentha sylvestris* var. *compacta*, *Mentha sylvestris* var. *crispa*, *Mentha sylvestris* var. *diffusa*, *Mentha sylvestris* var. *discolor*, *Mentha sylvestris* var. *flaccida*, *Mentha sylvestris* var. *floribunda*, *Mentha sylvestris* var. *grandis*, *Mentha sylvestris* var. *iberica*, *Mentha sylvestris* var. *incana*, *Mentha sylvestris* var. *lancifolia*, *Mentha sylvestris* var. *major*, *Mentha sylvestris* var. *marisensis*, *Mentha sylvestris* var. *microcephala*, *Mentha sylvestris* var. *microphylla*, *Mentha sylvestris* var. *mollis*, *Mentha sylvestris* var. *pallens*, *Mentha sylvestris* var. *simplex*, *Mentha sylvestris* var. *sordida*, *Mentha sylvestris* var. *subintegra*, *Mentha sylvestris* var. *thauasia*, *Mentha sylvestris* var. *wierzbickiana*, *Mentha syriaca*, *Mentha tenorei*, *Mentha tomentosa*, *Mentha uliginosa*, *Mentha viridis* subsp. *candicans*, *Mentha viridis* var. *canescens*, *Mentha viridis* var. *minutodonta*, *Mentha wierzbickiana* var. *richteri*, *Mentha wierzbickiana* var. *stenantha*, *Mentha wierzbickiana*, *Mentha ×dumetorum* var. *hispidula*, *Mentha ×nemorosa* subsp. *dulcissima*, *Mentha ×nemorosa* var. *crispa*, *Mentha ×niliaca* var. *sapida*, *Mentha ×rotundifolia* var. *maritima*, *Mentha ×villosa* var. *sapida*, *Mentha ×villosa* var. *tenorei*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Írán, Itálie, J Afrika, JV Evropa, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Pákistán, Polsko, S Afrika, SV Afrika, SZ Afrika

Roste v Evropě, západní a střední Asii a severní i jižní Africe jako větvená trvalka. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 0,75 (i 1,2)m. Listy jsou křížmostojné, střední a horní lodyžní jsou podlouhlé až vejčité, kopinaté či obkopinaté, špičaté, zubaté až pilovité, při mnutí aromatické, dlouhé (2 -) 5 - 9 (i 11)cm, široké (0,5 -) 2 - 4cm, báze je srdčitá, zakulacená nebo uťatá a na spodní straně žilky ochlupené. Květenstvím je hustý lichoklas délky (2 -) 4 - 5 (i 8)cm, listeny jsou čárkovité, délky květu, vlastní květy mají kalich krátce trubkovitý až úzce zvonkovitý, ochlupený, dlouhý (1,4 -) 1,8 - 2,3 (i 3)mm, z 1/3 3úhle až šípovitě cípatý, trubka má 10 žilek, koruna je růžově fialová až bílá a dlouhá (3 -) 4 - 4,5 (i 5)mm. Plodem je vekčitá tvrdka délky 0,8mm a šířky 0,6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *amphilema*
- var. *asiatica*
- var. *austro-afghanica*
- 'Buddleia' - dlouhé klasy
- subsp. *capensis* - jižní Afrika
- subsp. *grisella* - jihovýchodní Evropa
- var. *chlorodictya*
- var. *kermanensis*
- var. *kotschyana*
- var. *muqarrabica*
- subsp. *longifolia* (Máta dlouholistá pravá) - Evropa, severozápadní Afrika
- subsp. *noeana* - Turecko až Írán
- var. *petiolata*
- subsp. *polyadena* - jižní Afrika
- var. *schimperi*
- subsp. *typhoides* - severovýchodní Afrika, jihozápadní Asie
- subsp. *wissii* - jihozápadní Afrika

Vyhovují jí vlhká místa, jako např. louky, břehy, atp. Má ráda vápnitou půdu.

<https://www.rostliny.net/>