

Mentha suaveolens (Máta vonná)

synonyma: *Mentha bauhinii*, *Mentha bauhinii* f. *warionii*, *Mentha insularis*, *Mentha insularis* f. *cinereovirens*, *Mentha insularis* f. *compacta*, *Mentha insularis* subsp. *cinereovirens*, *Mentha insularis* subsp. *mirabilis*, *Mentha insularis* var. *balearica*, *Mentha insularis* var. *cinereovirens*, *Mentha insularis* var. *glabrata*, *Mentha linnaei* var. *germanica*, *Mentha macrostachya*, *Mentha macrostachya* f. *minutissima*, *Mentha macrostachya* var. *bauhinii*, *Mentha macrostachya* var. *elongata*, *Mentha meduanensis* var. *sepium*, *Mentha rotundifolia*, *Mentha rotundifolia* f. *glabrescens*, *Mentha rugosa* var. *oblongifolia*, *Mentha rugosa* var. *rotundifolia*, *Mentha sepium*, *Mentha sylvestris*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *suaveolens*, *Mentha* x *niliaca* var. *ripartii*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *bauhinii*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *bullata*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *crispa*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *elongata*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *gracilis*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *lepteilema*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *macrostachya*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *parviflora*, *Mentha* x *rotundifolia* f. *serrata*, *Mentha* x *rotundifolia* subsp. *gracilis*, *Mentha* x *rotundifolia* subsp. *insularis*, *Mentha* x *rotundifolia* subsp. *macrostachya*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *balearica*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *bauhinii*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *cinereovirens*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *elongata*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *glabrata*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *glabrescens*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *hadrophylla*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *humidicola*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *insularis*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *lepteilema*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *mabillei*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *melillensis*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *oblongifolia*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *reverchonii*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *risibilis*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *sardoa*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *serrata*, *Mentha* x *rotundifolia* var. *suaveolens*, *Mentha* x *villosa* var. *ripartii*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Alabama, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Baleáry, Belgie, Connecticut, Delaware, Florida, Francie, Illinois, Indiana, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Korsika, Kréta, Louisiana, Lucembursko, Maine, Maroko, Massachusetts, Michigan, Německo, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Washington

Pochází ze západní a jižní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Lodyhy jsou ochlupené. Listy jsou vejčité, ochlupené, dlouhé 2 - 4 (i 5)cm a široké (1,5 -) 2 - 3,5cm. Květenstvím je úzký řídký lichoklas (na bázi až přetrhovaný), kalich je široce zvonkovitý, dlouhý (1,2 -) 1,4 - 1,5 (i 1,9)mm, ochlupený, až z 1/3 3úhlé cípatý a koruna je zpravidla bělavá ve velikosti 2,3 - 3,3mm. Plodem je hnědá až hnědočerná síťnatá tvrdka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *insularis*
- subsp. *suaveolens* (Máta vonná pravá)
- subsp. *timija*
- 'Variegata' - smetanově panašované listy

Dobře snáší mráz.

<https://www.rostliny.net/>