

# Hyobanche

čeleď: Orobanchaceae

Patří mezi rostliny parazitující na kořenech. Roste v jižní Africe. Nejznámějším druhem je *H. sanguinea*.

## Hyobanche atropurpurea

## Hyobanche barklyi

## Hyobanche calvescens

## Hyobanche fulleri

## Hyobanche glabrata

## Hyobanche robusta

## Hyobanche rubra

## Hyobanche sanguinea (Kočičí drápek)

oblasti: Kapsko, Lesotho, Svazijsko

Roste v JAR, Lesothu a Svazijsku v podobě parazitické rostliny uchycující se na kořenech keřů. Povrch je růžový až červený a rostlina zcela postrádá zelený chlorofyl. Stonek je podzemní a může mít délku až 2m. Listy jsou šupinovité, přitisklé ke stonku. Kvete 5tičetnými přilbovitými květy s listeny a listenci, vlastní květy mají 2 páry kališních lístků, koruna je trubkovitá, hákovitá v barvě růžové až červené, zakončená 3mi laloky. Plodem je tobolka obsahující velké množství malých semen.

Vyhovují jí duny a kamenité svahy.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hyobanche-sanguinea/>

<https://www.rostliny.net/>