

Potamogeton berchtoldii (Rdest Berchtoldův)

synonyma: *P. subsp. groenlandicus*, *P. subsp. tenuissimus*, *P. var. colpophilus*, *P. var. lacunatus*, *P. var. major*, *P. var. polyphyllus*, *P. var. ramosissimus*, *P. var. tenuissimus*, *Potamogeton fieberi*, *Potamogeton groenlandicus*, *Potamogeton herchtoldii*, *Potamogeton lacunatus*, *Potamogeton lacunatus f. novae-angliae*, *Potamogeton pusillus subsp. groenlandicus*, *Potamogeton pusillus subsp. tenuissimus*, *Potamogeton pusillus var. berchtoldii*, *Potamogeton pusillus var. polyphyllus*, *Potamogeton pusillus var. tenuissimus*

čeleď: Potamogetonaceae

oblasti: Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Katalánsko, Makedonie, Německo, Polsko, Severní Amerika, Švýcarsko

Roste v Evropě, Asii a Severní Americe. Dorůstá délky 0,1 - 1m. Palisty jsou srostlé pouze na straně přivrácené k listu, úzce kornoutovitě svinuté okolo lodyhy nad uzlinou.

Vyhovují mu rybníky, příkopy, řeky, potoky, atp.

<https://www.rostliny.net/>