

Choerospondias axillaris

synonyma: *C. var. axillaris*, *Poupartia axillaris*, *Poupartia fordii*, *Rhus bodinieri*, *Spondias axillaris*, *Spondias axillaris var. pubinervis*

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Gansu, Guizhou, Hubei, Hunan, Japonsko, Sichuan, SV Indie, Thajsko

Roste v Číně, Japonsku, Indii a jihovýchodní Asii v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 8 - 20m. Borka je šedohnědá. Větve mohou být v mládí ochlupené, růžovofialovohnědé. Listy jsou dlouhé 25 - 40cm, řapíky zploštělé, lichozpeřené po 3 - 6ti, vlastní lístky jsou papírovité, vejčité, špičaté, celokrajné nebo pilovité, dlouhé 4 - 12cm, široké 2 - 4,5cm, báze zkosená, klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíčky jsou dlouhé 2 - 5mm. Samčí květenství je dlouhé 4 - 10cm, vlastní květy mají 5třílňý kalich, korunní lístky dlouhé 2 - 3mm a 10 tyčinek. Plody jsou eliptické, žluté, dlouhé 2,5 - 3cm a široké 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *axillaris*/*Poupartia axillaris*/*Poupartia fordii*/*Spondias axillaris*/*Spondias lutea* - Čína, Japonsko, Indočína, Indie; povrch holý

- var. *pubinervis*/*Spondias axillaris var. pubinervis* - Čína; větve v mládí, vřetena, řapíky, řapíčky a spodní strana centrálního žebra jemně ochlupená

<https://www.rostliny.net/>