

Thelypteris palustris (Kapradíník bažinný)

synonyma: Dryopteris thelypteris

čeleď: Thelypteridaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Indie, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, J Čína, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Afrika, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Slovensko, Střední Asie, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky a v Evropě v podobě trvalky. Dorůstá výšky (20 -) 25 - 30 (i 80)cm. Pod zemí vytváří tenký plazivý černý oddenek. Čepel je 1x zpeřená, tvořená 15 - 25ti páry peřenoklaných až peřenosečných lístků s krátkým řapíčkem, dlouhá 20 - 80cm, celkový tvar se na vrcholu zužuje do špičky (báze špičatá není), při okraji na spodní straně vytváří kupky výtrusnic.

Vyhovují ji vlhké břehy, rašeliny nebo dokonce i mělčiny do 10cm. Dokáže ale růst i na sušších místech na slunci i ve stínu. Dále potřebuje kyselejší půdu.

<https://www.rostliny.net/>