

## Lithocarpus ewyckii

synonyma: Cyclobalanus ewyckii, Lithocarpus pseudolamponga, Pasania ewyckii, Quercus ewyckii, Quercus ewyckii var. latifolia, Quercus lamponga var. ewyckioides, Synaedrys ewyckii

čeleď: Fagaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m při průměru kmene 20 - 90cm. Borka je šedohnědá. Palisty jsou opadavé, dlouhé 5mm a široké 1 - 2mm. Listy jsou mírně kožovité, lesklé, hnědé, dlouhé 6 - 18cm, zašpičatělé, široké 2 - 7cm, spodní strana ochlupená, báze špičatá, žilnatinu tvoří 12 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství může být samčí, oboupohlavné nebo smíšené, ochlupené, samčí květy vyrůstají po 1 - 3ks, samičí samostatně. Plodenství tvoří mělce pohárkovité číšky délky 0,5 - 1cm, průměru 2 - 3cm na 0,5 - 1cm stopce, nažky jsou světlehnědé, lesklé, vejčité a dlouhé 2 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>