

Lithocarpus hancei

synonyma: Cyclobalanopsis ternaticupula, Cyclobalanopsis ternaticupula f. arisanensis, Cyclobalanus hancei, Cyclobalanus ternaticupula, Lithocarpus arisanensis, Lithocarpus arisanensis var. globosa, Lithocarpus jingdongensis, Lithocarpus kuarunensis, Lithocarpus kuarunensis var. lepidobalanus, Lithocarpus matsudae, Lithocarpus mupinensis, Lithocarpus omeiensis, Lithocarpus spicatus var. mupinensis, Lithocarpus subreticulatus, Lithocarpus ternaticupulus, Lithocarpus ternaticupulus f. matsudae, Lithocarpus ternaticupulus var. arisanensis, Lithocarpus ternaticupulus var. subreticulata, Pasania brevicaudata var. arisanensis, Pasania confertifolia, Pasania hancei, Pasania hancei var. arisanensis, Pasania hancei var. ternaticupula, Pasania kuarunensis, Pasania rhododendrophylla, Pasania ternaticupula, Pasania ternaticupula var. arisanensis, Pasania ternaticupula var. matsudai, Pasania ternaticupula var. subreticulata, Quercus arisanensis, Quercus hancei, Quercus subreticulata, Quercus ternaticupula, Synaedrys hancei, Synaedrys kuarunensis, Synaedrys matsudae, Synaedrys ternaticupula

čeleď: Fagaceae

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hubei, Sichuan, Tchaj-wan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky do 15m. Větve jsou v mládí hnědožluté až šedé. Listy jsou eliptické, celokrajné, tupé či špičaté, dlouhé 5 - 10cmm, široké 2,5 - 5cm, báze sbíhavá, žilnatinu tvoří 6 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 4cm. Plodenství tvoří mělké číšky délky 3 - 7mm, průměru 1 - 2cm, nažky jsou prakticky kulovité, dlouhé 0,8 - 2cm a široké 0,6 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>