

Lithocarpus hystrix

synonyma: *Castanea furfurella*, *Cyclobalanus cyrtopoda*, *Cyclobalanus hystrix*, *Lithocarpus cyrtopodus*, *Pasania hystrix*, *Quercus brevipetiolata*, *Quercus cyrtopoda*, *Quercus hystrix*, *Quercus kajan*, *Quercus korthalsii* var. *hystrix*, *Quercus mappacea* var. *hystrix*, *Synaedrys hystrix*

čeleď: Fagaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Borneu a Malajském poloostrově v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m při průměru kmene 20 - 90cm. Borka je nahnědlá. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou dlouhé 0,3 - 1cm a široké 2 - 5mm. Listy jsou mírně kožovité, tmavěhnědé, ochlupené, špičaté, dlouhé 12 - 20cm, široké 5 - 8cm, spodní strana je ochlupená, báze zakulacená, žilnatinu tvoří 12 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství může být samčí, oboupohlavné nebo smíšené, samčí květy vyrůstají po 1 - 3ks, samičí bývají samostatné. Plodenství tvoří mělce pohárkovité číšky na až 5mm stopce, mají délku 0,5 - 1cm, průměr 2 - 3cm, nažky jsou zploštěle vejčité, dlouhé 1,5 - 2cm a v průměru mají 2 - 3cm.

<https://www.rostliny.net/>