

Amaranthus caudatus (Laskavec ocasatý)

čeleď: Amaranthaceae

oblasti: Arizona, Bosna a Hercegovina, Connecticut, Česká republika, Delaware, Egypt, Florida, Idaho, Illinois, Írán, Itálie, Jižní Amerika, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kypr, Maine, Makedonie, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, New York, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Rumunsko, Sicílie, Sinajský poloostrov, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin

Pochází pravděpodobně z Jižní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2 (i 1,5)m. Stonek je bohatě větvený. Listy jsou mají vejčitý, kopinatý nebo eliptický tvar s plastickou žilnatinou, délku 2,5 - 15cm, šířku 1 - 8cm a řapík délky do 8cm. Květenstvím je převislý lichoklas délky i více než 30cm, šířky 1,5cm, vlastní květy jsou 5tičetné, zelené (většinou se ale setkáte s červenými z různých kultivarů), samčí mají kališní lístky úzce eliptické, špičaté, dlouhé 2,5 - 3,5mm a samičí jsou dlouhé 1,75 - 2,5mm. Plodem je nažka délky 2 - 2,5mm. Listy i semena jsou jedlá. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. atro-purpureus
- f. albiflorus - bílé květy
- subsp. caudatus/subsp. alopecurus (Laskavec ocasatý pravý) - černá semena
- f. gibbosus
- f. viridis
- subsp. saueri (Laskavec ocasatý Sauerův) - bílou nebo narůžovělá semena

Vyhovuje mu plné slunce. Nesnáší teploty pod 0°C. Ideální půdou je lehká humózní a vápnitá, ale není nezbytně nutná.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>