

Amaranthus retroflexus (Laskavec ohnutý)

čeleď: Amaranthaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Baleáry, Belgie, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Florida, Francie, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Izrael, Japonsko, Jižní Dakota, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Mongolsko, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, S Jižní Amerika, S Mexiko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Amerika, SZ Rusko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Pochází z tropické Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,3 - 0,75 (i 2 - 3)m. Lodyha je od báze do střední části větvená a hustě krátce ochlupená. Listy jsou vejčité, dlouhé (1 -) 5 - 11 (i 15)cm, široké (0,6 -) 3 - 6cm a řapíky jsou dlouhé do 6cm. Kvete červenými nebo zelenými květy v husté kuželovité ocasovité latě. Květy jsou dále seskupené do klubiček. Plodem je jednosemenná tobolka velikosti 2mm a obsahuje černé zploštělé semeno velikosti 1mm.

Vyhovují mu pole, okraje cest, skládky, plevel v okopaninách, atp. Může růst i v mírně zasolených půdách.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>