

# Alangium chinense

synonyma: *Alangium begoniifolium*, *A. subsp. pauciflorum*, *A. subsp. strigosum*, *A. subsp. triangulare*, *A. var. pauciflorum*, *Alangium kenyense*, *Alangium octopetalum*, *Alangium platanifolium* f. *triangulare*, *Guettarda jasminiflora*, *Karangolum chinense*, *Marlea affinis*, *Marlea begoniifolia*, *Marlea chinensis*, *Marlea virgata*, *Stelanthus solitarius*, *Stylidium bauthas*, *Stylidium chinense*, *Stylis chinensis*

čeleď: Cornaceae

oblasti: Angola, Čína, Demokratická Republika Kongo (Zair), Fernando Poo, Filipíny, Japonsko, Kambodža, Kamerun, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Pákistán, S Indie, Thajsko, Uganda, Velké Sundy, Vietnam

Roste v tropické Africe, jihovýchodní Asii a Číně v podobě stromu (i keře). Dorůstá výšky 10 - 25 (i 27)m. Borka je hladká a šedá nebo růžovofialovo hnědá. Listy jsou eliptické, vejčité až kulaté, mohou být mírně laločnaté, zpravidla asymetrické, špičaté, v mládí ochlupené, dlouhé 6 - 30cm, od báze 3 - 7mižilné, báze 3úhlá, uťatá až srdčitá a řapíky jsou dlouhé 4 - 6cm. Květenství je 4 - 50tičetné, vlastní květy jsou bílé až nažloutlé, 5 - 8mičetné, kalich má 10 zubů délky 2,5mm a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1 (i 1,5)cm. Plody jsou žlutozelené, kulovité až eliptické, dlouhé 0,8 - 0,9 (i 1,4)cm, široké 4 - 9mm a ochlupené. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *chinense*/*A. taiwanianum*/*Stylidium chinense* - mladé větve, řapíky a květenství bez dlouhých chlupů; květenství 7 - 50tičetné
- subsp. *pauciflorum* - listy vejčité, celokrajné, báze kulatá; květenství pravidla 3 - 6tičetné
- subsp. *strigosum* - mladé větve, řapíky a květenství s dlouhými chlupy; květenství 7 - 50tičetné
- subsp. *triangulare*/*A. platanifolium* f. *triangulare* - listy zpravidla kulaté, 3 - 5tilaločné s kopinatými až vejčitými laloky, báze 3úhlá až prakticky kulatá; květenství bývá 3 - 6tičetné

<https://www.rostliny.net/>