

Cleome spinosa (Luštěnice trnitá)

synonyma: *Cleome heptaphylla*, *Cleome pubescens*, *Cleome pungens*, *Cleome pungens* var. *swartziana*, *Cleome sandwicensis*, *Cleome spinosa*, *C. f. horrida*, *C. f. pungens*, *C. var. horrida*, *C. var. subinermis*, *Cleome tonduzii*, *Neocleome spinosa*, *Tarenaya spinosa*

čeleď: Cleomaceae

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Pákistán, Portoriko

Pochází z tropů Jižní Ameriky. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 1,5)m. Povrch je trnitý a žláznatý. Listy jsou dlanitě dělené na 5 - 7 lístků, vlastní lístky jsou vejčitékopinaté, dlouhé do 10cm, široké 2 - 3cm a spodní mívají delší řapíky. Květenstvím je bohatý hrozen, vlastní květy jsou bílé nebo růžové, dlouze stopkaté, průměru 2 - 2,5cm, kališní lístky jsou dlouhé 5 - 8mm, korunní lístky jsou 2 - 3x delší, pysk je obvejčitý a široký 1cm. Plodem je válcovitá čárkovitá tobolka délky 3 - 4,5cm, šířky 3 - 3,5mm a obsahuje mnoho semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Colour Fountain'
- 'Golden Sparkler'
- 'Helen Cambell'
- 'Pink Queen'
- 'Rose Queen'

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>