

Cucurbita maxima (Tykev obrovská)

synonyma: Cucumis rapallito, Cucumis zapallito, Cucurbita farinae, C. subsp. maxima, C. var. boliviana, C. var. chiloensis, C. var. triloba, C. var. turgida, C. var. zapallito, C. var. zipinka, Cucurbita pepo var. maxima, Cucurbita pileiformis, Cucurbita rapallito, Cucurbita sulcata, Cucurbita turbaniformis, Cucurbita turbaniformis var. chiloensis, Cucurbita zapallito, Pepo maximus, Pileocalyx elegans

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Arkansas, Česká republika, Jižní Karolína, Maine, Massachusetts, Michigan, New York, Ohio, Pákistán, Pennsylvania, Peru, Portoriko, Severní Karolína, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin

Roste v Peru jako jednoletá a jednodomá bylina. Lodyha je poléhavá, ochlupené, dlouhá až 10m a je opatřena úponky, které se při styku se zemí mění na kořeny. Listy jsou ledvinovité nebo 5 - 7x mírně dlaniť laločnaté a velké. Kvete žlutými zvonkovitými květy o průměru 7 - 10 (i 15)cm, kalich má čárkovité laloky, samčí mají stopky štětinatě ochlupené. Plody jsou kulovité až válcovité, hladké nebo žebnaté, velikosti 0,3 - 0,8 (i 2)m, váha může dosáhnout i několika kg, stopka je velká, není žebnatá, korkovitá a plod obsahuje bílé, hnědá nebo bronzová zploštělá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. andreana
- 'Atlantic Giant' - držitelka Guinnessova rekordu; půda bohatá na živiny; rostlině zanechejte pouze 1 plod
- 'Blue Hubbard'
- 'Blue Kuri' - modrá
- 'Cinderella'
- 'Gigante' - oranžové plody o váze 5kg; vhodná na kompoty i pečení
- 'Hokkaidó' - plody menší, oranžové, na obou koncích zašpičatělé; skladovatelná a chutná
- 'Jarrahdale' - kříženec 'Blue Hubbard' a 'Cinderella'; žebrovaná
- 'Kaboča'/'Hokkori' - zelená
- 'Marina di Chioggia' - hrbolatá

<https://www.rostliny.net/>