

Echium vulgare (Hadinec obecný)

synonyma: *Echium anglicum*, *Echium elegans*, *Echium lacaitae*, *Echium laetum*, *Echium lusitanicum*, *Echium molle*, *Echium monstrosum*, *Echium parviflorum*, *Echium schifferi*, *Echium spinescens*, *Echium tenoreanum*, *Echium tuberculatum*, *Echium vaudense*, *Echium violaceum*, *E. f. albiflorum*, *E. var. grandiflorum*, *E. var. lacaitae*, *Echium wierzbickii*

čeleď: Boraginaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Střední Asie, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Asie, Západní Virginie

Roste v Evropě a v západní a střední Asii jako dvouletka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,8 (i 1,2)m. Lodyha má červené skvrny, bradavky a je štětinatě ochlupená. Listy jsou laločnaté, také štětinaté, bazální podlouhlé a lodyžní úzce kopinaté. Kvete zprvu růžovými květy, které se později mění na modrofialové (i bílé), mají průměru 1,5 - 2cm, jsou seskupené ve vijanech a ty dále v hroznech. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *argentae*
- subsp. *asturicum*
- subsp. *granatense*
- subsp. *pustulatum* - Španělsko; výška 1m; listy eliptické až obkopinaté, v přízemní růžici dlouhé 25cm, široké 2 (i 3)cm, lodyžní jsou dlouhé 9cm a široké 1,5cm; květy mají kalich velikosti 4,5 - 6 (i 7,5)mm, koruna má velikost 1,1 - 2cm; tvrdka má velikost 2,2 - 2,8mm
- subsp. *vulgare* (Hadinec obecný pravý)

Vyhovují mu suchá slunná místa s písčitou nebo kamenitou zemí, např. u okrajů silnic a cest.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>