

Amsinckia spectabilis

synonyma: *Amsinckia acuminata*, *Amsinckia celsa*, *Amsinckia constricta*, *Amsinckia davyi*, *Amsinckia dimorpha*, *Amsinckia divaricata*, *Amsinckia fulgens*, *Amsinckia granulosa*, *Amsinckia inflatula*, *Amsinckia intermedia* var. *saint-nicolai*, *Amsinckia intermedia* var. *sancti-nicolai*, *Amsinckia kelloggii*, *Amsinckia latifolia*, *Amsinckia leptosperma*, *Amsinckia littoralis*, *Amsinckia lycopsoides* var. *bracteosa*, *Amsinckia maculata*, *Amsinckia maritima*, *Amsinckia mathewsii*, *Amsinckia microsperma*, *Amsinckia nigricans*, *Amsinckia oblongifolia*, *Amsinckia ovata*, *Amsinckia saint-nicolai*, *Amsinckia scouleri*, *A. var. bracteosa*, *A. var. nicolai*, *A. var. saint-nicolai*, *A. var. sancti-nicolai*, *Amsinckia truncata*, *Benthamia maritima*, *Benthamia sancti-nicolai*, *Benthamia spectabilis*, *Lithospermum lycopsoides*

čeleď: Boraginaceae

oblasti: Britská Kolumbie, Illinois, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v USA a Kanadě jako jednoletky. Listy jsou celokrajné nebo zubaté. Květenstvím je jednostranné, tvořené žlutými trubkovitými květy o délce do 2cm a průměru 1,5cm.

Vyhovují jí písčité půdy.

<https://www.rostliny.net/>